

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百八十五

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十五 明

周王朱橚 撰

嬰孩諸熱痘腫門

風熱

附論

夫小兒體性純陽熱氣自盛因觸犯風邪與熱氣相搏
外客皮毛內壅心肺其狀惡風壯熱胸膈煩悶目澁多
渴是也

方

珍珠丸

治小兒風熱心神驚悸夜卧不安

珍珠

末

羌活

去蘆頭

防風

去尖

鉤藤

龍胆

天竺黃

別研升麻

牛黃

研各一分

茯神

去皮

人參

羚羊角

鎔

犀

角

鎔各一兩

鉛霜

研

龍腦

研

麝香

研各一分

右搗研為細末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸荊芥薄荷湯化下日三服治一切驚涎量兒大小加減

牛黃丸

治小兒風熱身體溫壯利膈化涎安神鎮心

牛黃

研

龍腦

研

麝香

研各半錢

甘草

炙

雄黃

研

天竺黃

研
丹砂研 人參 遠志去心 乾蝎去頭 山芋 白殭

蠶各一錢 天南星水煎一日透要焙切 天麻各一字

右搗研為末煉蜜和丸如鷄頭大每服一九分四服
金銀薄荷湯化下不拘時候量大小加減

丹砂九 治小兒風熱多驚

丹砂研水飛 柴胡去苗 鐵粉研 麥門冬去心焙 白茯苓去黑

心皮各半兩 天竺黃研 人參 黃耆剉 黃芩去心 甘草

炙剉各一分 牛黃研 麝香研各一錢

右搗研為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸煎竹葉湯化下量兒大小加減一方有茯神半兩

犀角丸 治小兒風熱心神驚悸

犀角屑

半兩

牛黃

錢研一

硃砂

半兩

水飛

天竺黃

半兩

鉛

霜

一分

鐵粉

人參

半兩

赤茯苓

半兩

蚱蟬

一分

龍腦

錢

麝香

錢

白附子

一分

炮

右搗羅為散入研令勻煉蜜和丸搗一二百杵如桐子大每服以薄荷湯研下三九量兒大小以意加減

鈎藤湯 治小兒風熱驚疳潮熱

鈎藤

一兩

史君子

去皮

乾蝎

炒

人參

子芩

川大黃

剉微炒

犀角屑

各一分

蚱蟬

三枚微炒

甘草

半兩剉炙微赤

石膏

半兩

川升麻

半兩

右搗篩為末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹瀝半合牛黃末一字看大小分加減

寸金湯 治小兒風熱

鬱金

大黃

各一兩

皂莢

二兩用金汁浸煎一二沸煮軟切片曝乾

馬牙硝

當歸

切焙

山梔子仁

各半兩

人參

甘草

炙

赤芍藥

各一兩

雄黃

少許好者

右粗搗篩每服半錢水七分薄荷三葉同煎四分去

滓冷服日一服

牛黃丸

治小兒風熱心神煩躁不得少睡

牛黃

一錢細研

硃砂

半兩水飛研

黃芩

犀角屑

半兩

川升麻

人參

半兩去蘆

麥門冬

去心焙

防風

去蘆

赤茯苓

甘草

炙微

赤各等分

右搗羅為散入研了藥研勻煉蜜九如菜豆大每服
竹葉湯嚥下五九三日四服量大小以意加減服之
茯神九 治小兒風熱潮作肌體煩倦不思飲食安鎮
心神

茯神

去末

麥門冬

去心焙各半兩

犀角

梔子仁

白鮮皮

升麻

玄參

車前子

各一分

鉄粉

研

丹砂

研各半兩

右搗羅八味為末與鐵粉丹砂研勻煉蜜和九如菜
豆大每服五九溫水下不拘時量兒大小以意加減

鉛霜九 治小兒風熱宜服鎮心安神化涎

鉛霜研細 天麻 牛黃研細 天竺黃研細 甘草 麝香研細

各一錢 茯神二錢 龍腦一分 人參 硃砂半兩細研水飛

右搗羅為末研了藥令勻煉蜜和九搗一二百杵丸如梧桐子大不計時候以薄荷湯研下一丸量兒大

小以意加減

化涎餅子 治小兒風熱涎盛發喘嗽

鉄粉研 人參 白朮 礪砂 馬牙硝 粉霜

牛黃 麝香

各一錢

丹砂

二錢研

右搗研為細末煉蜜和丸如皂子大捻作餅子別以丹砂為衣二歲兒服半餅子薄荷湯化下

羚羊角湯 治小兒風熱心膈煩悶身體壯熱少睡多渴

羚羊角

鎊

麥門冬

去心焙

甘草

炙剉各三分

白茯苓

去黑皮一

方有茯神

白鮮皮

升麻

人參

黃耆

各半兩

右粗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹瀝

半合更煎沸分為二服量大小加減

桔梗煮散

治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱等證

桔梗

剉炒

細辛

去苗

人參

白朮

蘇蘇根

甘草

炙剉

白茯苓

去黑皮

芎藭

各等分

右搗羅為散每服二錢水一盞生姜一片薄荷三葉

同煎至六分去滓服三歲以上至五歲連進二三服

即瘥小兒發熱不問傷寒熱便與數服無不愈煎服

小黑膏丸

白蘚皮散 治小兒心肺風熱壅滯胸膈不利

白蘚皮 防風 黃芩 犀角屑 知母 沙參

去蘆各半兩 甘草 炙微赤 對一分

右搗篩為散每服一錢水一小盞煎五分去滓量兒

大小加減溫服

鎮心鉛霜散 治小兒肺心風熱多驚鎮心

鉛霜 二分 天竺黃 一分 硃砂 二錢 柏子仁 白附

子 炮煨 等分

右搗羅為散如研了藥都令勻每服以荊芥薄荷湯調下半錢日三四服量兒大小以意加減

桃符丸 治小兒風熱

大黃 郁李仁 黃蘗 宣黃連 鬱金 巴

各一分

豆 二七介去皮油為霜輕粉二錢

右為末滴水為丸棗豆大以硃砂為衣每服二丸用

桃符煎湯看人大小加減

人參湯 治小兒多驚風熱

人參

白茯苓

去黑皮

甘草

炙

大黃

剉

芍藥

鈎藤

當歸

焙各半兩

右搗粗篩每服一錢水八分入竹葉五片煎至五分

去滓溫服

麻黃湯 治兒風癰痰入經絡邪氣頭疼

麻黃

去根節煮掠去末焙

防風

去皮

芍藥

羌活

去蘆頭

葛根

剉

甘草

炙各一兩

荊芥穗

二錢

右粗搗篩每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服

鬱金散 治小兒風熱胸膈煩悶目澁多渴

鬱金

半兩

蟬蛻

四個
去足

龍胆

白附子

焙各半兩

大黃

炒

乾

蝎

炒

甘草

各一兩

右搗羅為散每服一字至半錢量兒大小空心煎薄

荷湯下

大麻仁散 治小兒肝肺風壅心膈不利痰嗽

大麻仁

半兩

百合

半兩

犀角屑

半兩

杏仁

湯浸去皮雙

仁麩炒黃半

兩

牛黃

一錢

檳榔

一錢

龍腦

一錢
細研

右搗羅為散每服煎生姜甘草湯調下半錢量兒大小以意加減

白朮生犀散 治小兒一切風熱

白朮

桔梗

微炒

甘草

炙

馬牙硝

研各半兩

麝香

研一錢

生

犀角

半兩

右搗羅四味為散與二味研者和勻每服半匕熟蜜水調下薄荷熟水亦可量兒大小加減

犀角丸

治小兒風熱痰實面赤大小便秘澀三焦邪熱

臟腑蘊毒導散極穩

牛犀丸

半錢

人參

半兩

黃連

一兩

枳實

去穢炙

大黃

一兩

酒浸切片已豆去皮一百十粒在大黃上紙煨即上蒸三次切炒令黃焦去巴豆不用

檳榔

半兩

右為細末煉蜜為丸如麻子大每服一二十丸臨卧熟水下未動加數丸治大人孕婦無損

綠霞丸 治小兒風熱身如火炭夜則多哭

栢葉

半兩

全蝎

鬱金

僵蠶

炒去絲

雄黃

各一分

南

星 姜汁湯炮三五次
後乾炮煨一分

右為末三歲一錢薄荷蜜湯下一方任調

涼心煮散 治小兒風熱

連翹

防風

去人

甘草

炙

山梔子仁

雞蘇

惡實

炒各
半兩

右為散每服二錢水一盞煎三五沸量兒大小加減

天竺黃散

治小兒驚風風熱

天竺黃

蟬蛻

白姜蠶

炒

山梔子仁

甘草

鬱金

右等分搗羅為散每服一錢熟水調下三歲兒可服
半錢未晬一字

天竺牙硝散 治小兒風熱

天竺黃

馬牙硝

各半兩研

丹砂

生龍腦

研

葛根

滑石

各一分

右搗研為細散每服半錢新汲水調下

防風湯 治小兒風熱止渴除風疹治驚悸

防風

去入

黃耆

剉

甘草

炙剉

人參

連翹

各半兩

山梔子

仁

一分

右粗搗篩每服一錢水八分煎六分去滓溫服

抱龍丸

治小兒風熱壅毒閉膈滯寒涼心壓驚

右以臘月黃牛胆一枚天南星好者炮去皮臍搗為

細末填滿膽中緊緊通風處陰乾去胆皮取藥每一

兩入金銀箔小者各十片丹砂一錢半龍腦麝香各

一字同研細煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九竹葉

水化下歲數小者半丸

柴胡不香湯 治小兒風熱潮作不思飲食肌體消瘦

柴胡

去苗
十兩

木香

一人

半夏

湯洗七遍去
滑各二兩

黃芩

去黑
心

甘草

炙三
兩

右粗搗篩每服二錢水一盞入姜二片大棗一枚擘
煎至六分去滓溫服不拘時候

龍胆丸 治小兒肺心風熱

龍腦

三錢
去麝

胡黃連

二錢

牛黃

一錢
研

川大黃

二錢

犀角屑

二錢

右搗羅為末入牛黃都令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以薄荷湯化破服五丸量兒大小以意加減

宣風散

疎導風熱

方見本門
疹瘡類

越桃飲 治小兒風熱

越桃

去皮
一兩

甘草

剉一
兩

藿香葉

石膏

飛過各
半兩

右用蜜二匙塗在銚子內先炒甘草赤色次下越桃藿香葉炒微黑為度搗羅為末入石膏研勻每服一

錢七新汲水調下

人參桔梗散 治小兒風熱

人參 白茯苓

去黑皮

桔梗

微炒

甘草

炙剉

右等分搗羅為散每服半錢七熱水調下

牛黃散 治小兒風熱心胸煩悶

牛黃

一分鬱金

半兩取末

人參

一錢取末

右細研勻每服半錢荊芥湯調下日進三四服量兒

大小以意加減

珍珠散 治小兒挾風蘊熱

太陰玄精石

一兩石膏 三錢龍腦 半錢

右搗研極細每服半錢新汲水調下

鉤藤散

治小兒風熱驚悸

方見本門壯熱類

連翹 瞿麥 車前子 牛旁子 赤芍藥 滑

石

各一兩

梔子仁

木通

當歸

防風

各半兩

荊芥

黃芩

各半兩

柴胡

甘草

各二兩

蟬殼

二錢半

右咬咀燈心煎

辛芎散 去風邪退身熱

茯苓

去皮

川芎

各等分

人參

甘草

炙

桔梗

去蘆

細辛

去苗

白朮

右為咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓稍熟不

飢不服

大黃丸 治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不

止有不正者宜服之

川芎

半兩剉

黑牽牛

半兩半生炒

大黃

一兩酒洗過飯上蒸熟切片暴

乾
甘草 一分
剉炙

右為細末稀糊為丸如麻子大二歲每服十九溫蜜水下乳後唐利為度未利加丸數再服量兒大小虛實用之

紅綿散 治風熱頭目不清

白殭蚕

二兩直者炒

天麻

一兩生

南星

一兩切浸黃

蘇木

二兩半研

右為末每服一錢入紅綿少許煎六分食前傷寒有表正發熱者每服入去節麻黃末一字有裏證心躁

熱渴入滑石末半錢或一字同煎

惺惺散 治風頭痛壅疼咳嗽清涕或凝疹瘡

半夏製 南星 常山 草薺 陳皮製 厚朴製 檳

榔 秦艽 柴胡 蒼朮 烏梅 良姜

右咬咀酒水各一盞桃柳枝各七寸甘草一寸煎去
滓露一宿次日鷄鳴時服

又方

用常山生煨草果各一錢東方桃枝七寸煎入生姜

汁半盞露一宿五更服

壓熱抱龍圓 治小兒風熱痰盛驚癇搐搦五心煩熱

睡卧不寧精神不悅

天南星

一兩切作片子用雪水一碗甘草一兩匙碎煮軟切焙別為主雄黃一錢細研

水飛過

硃砂

一錢乳鉢研極細

牛黃

半錢研為末

天竺黃

二錢研為末

麝香

一字研入諸藥拌和

右件和勻滴雪水為丸如鷄頭子大每服一歲以下一丸用薄荷湯化下日午臨卧服三歲左右一九半余

長周晬囊長青到永州方脉蔣冥用此藥數服即變
黃今家間小兒常服之

清心丸 治風熱不睡

天竺黃 大黃 黃連 牡蠣 遠志 梔子仁

炒 黃芩 甘草

右為末煉蜜和丸如菉豆大新汲井水吞下

茯神散 治風熱驚悸心虛盜汗

茯神 山藥 全蝎 遠志 甘草 白附子

荊芥 蟬蛻 硃砂 金箔 麝香

右為末燈心湯調下

蝎尾散 治風熱

茯苓 蝎尾 飛羅麵 硃砂 山藥 麝香

甘草

右為末麝香湯入酒下滴調下

升麻飲子 治小兒臟腑積熱面赤煩渴痰實不利腸
胃煩燥澁一切風壅並皆治之

山梔子仁 防風 甘草 大黃 連翹 升麻

各等分

右咬咀每服二錢水六分煎至四分去滓溫服乳食後大便尚未通入芒硝半錢再略煎熟服

地黃煎丸 治小兒血熱風壅大人亦宜服之

生地黃洗切焙乾熟乾地黃洗切焙乾薄荷葉洗去土甘

草一兩半山梔子仁二兩片白腦子一兩

微炒

半

別研

右件為末後入腦子同研勻煉蜜為丸每一兩作四

十九每服兩九溫水化下乳食後臨卧服大人每服五九至十九

淡竹葉粥 治小兒臟肺風熱精神恍惚

淡竹葉

一握切

粳米

一合茵陳

半兩

右以水化下一大盞煎二味取汁一盞去滓投米作粥食之

羌活丸 治風熱化痰安驚

羌活 荊芥穗 甘草 桔梗 白朮 白附子

川芎

防風

茯苓

各二兩

硃砂

二錢 一半入藥 一半為衣

右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一九用薄荷煎湯化下如涎盛加葛湯下此方最穩

防風湯

治風熱痰壅大便不通

羌活

防風

枳實

各半兩

川芎

甘草

炒

大黃

濕紙

煨各二錢半

右判末每服三字姜棗煎服

阿膠散

治風熱涎潮喘促搐掣竄視

透明阿膠

炒二錢半

紫蘇

一錢

右為末每服一錢入烏梅肉少許煎灌下神效熱出於肺熱則生風阿膠清肺行小便故也肺風之妙藥驚涼散 治風熱相搏手足搐搦目睛上視

龍胆草末

防風末

青黛

研各三錢

龍腦

一錢七分

鈎藤

三錢末

黃連

五錢七分

牛黃

麝香

各一字

右為細末麪糊丸粟米大每一二十九金銀湯溫服

麥門冬湯

治小兒風熱塞滯壯熱煩渴時候

麥門冬

去心
一兩

蘇蘇根

知母

焙

人參

藜蘆

去蘆
頭各

一兩 龍胆

半兩

粟米

合

右搗粗篩每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服

金星丸

治風熱結聚喉內痰鳴喘麓咳嗽紅頰腮赤

腫疼咽膈壅塞目閉眼多眵膿發熱狂言煩焦多渴

卻生驚風或大便不通小便如血諸熱壅類宜服之

鬱金末

一分

雄黃

同上
另研

膩粉

半錢

巴豆

七粒
去油

右末米醋糊丸如麻子大薄荷湯臘茶清下又方全

蝎梢一錢 天南星一箇 泡尤佳 如痰實大便風結熱
病實證宜加九數一服神效

壯熱 附論

夫小兒壯熱者由陰陽不和氣盛血實邪熱之氣客于
腸胃蘊蓄日久薰發飢肉故令身體壯熱其脉三部俱
實者是也亦有乳食不化及食物不消蒸鬱於外令兒
壯熱口乾煩渴其寸脉浮而大按之反澀者是也 小
兒壯熱者是小兒血氣五臟生熱薰發於外故令身體

壯熱大體與溫壯相似而又小異或挾伏熱或挾宿寒其
挾伏熱者大便黃而臭挾宿寒者糞白而酸氣此二者
臟腑不調冷熱之氣俱乘腸胃蘊積漸染而發溫溫然
熱不盛甚是溫壯也其壯熱者是血氣薰於外其發無
漸壯熱甚以此為異若壯熱不渴則變為驚極重者亦

變癇也

錢氏附方論小兒壯熱昏睡傷風熱瘡疹傷食皆相似未能辯認間服升麻葛根湯惺惺散小

柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便醋臭不消化促食或吐食宜以藥下之張奐瑾按小兒冬末春初溫厚之衣或乳母恣食酒麪甘肥等物令兒心肺不和因蘊邪熱因其解脫風邪傷于皮毛傳於

臟腑則令胸膈痰滯身體壯熱心神驚悸又以傷寒時
氣瘡疹之類及各風熱候莊氏家傳小兒壯熱有七候
傷寒後渾身壯熱時時舌出繳唇班瘡候多咳嗽下
身噴渾身壯熱惟耳鼻不熱然歲逆也風熱渾身壯
熱鼻兩邊胞動叩叩然甚者鼻內生瘡手有血紋也氣
猜候渾身壯熱早晨手足冷饒沉重困悶晚晡發潮熱
虛猜候渾身壯熱脚冷手不冷在肋右卧臑赤在肋即
左臑赤也驚熱候亦渾身壯熱愛睡妄語睡便即仰卧
驚跳啼叫搖頭弄舌上竄也喉咽痺候亦渾身壯熱時
時發嗽飲水喉痛復小寒也上七候宜在詳審用藥

方

大黃散 治小兒壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

枯薑根

甘草

各炙

牡蠣

熬

龍骨

凝水石

研

白石脂

各半兩

滑石

研

硝石

研

人

參

桂皮

去粗皮
二兩

右以分去滓溫服食後相繼三服隨兒大小加減一方加紫石英半兩先以九味麤搗篩入研藥和勻五六歲兒每服水一鍾盞煎

大黃散

治小兒暮歲至三歲壯熱

川大黃

剉研微炒一兩

石膏

一兩半

柴胡

去苗

川升麻

枳殼

麤炒微黃去穢

黃芩

赤芍藥

各三兩

梔子仁

二分

知母

三分杏

仁湯浸去皮尖雙仁
麩炒令黃各三分

右為散每服一錢水一小盞入青竹葉七片煎五分
去滓量兒大小加減服之

鈎藤散 治小兒壯熱驚悸大小便赤色亦澀

鈎藤 天竺黃細研地骨皮各一分茯神 犀角屑

龍胆去蘆頭川芒硝 甘草 赤茯苓各半兩川大黃

三分對
微炒

右為末每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大

小加減溫服一方無扶神

山葛湯 治小兒身上有赤處按聖惠方云傍赤點者
胭脂向止皮微皺者是也若不急治必作壯熱喘急
危殆之疾

黑參 黃芩

枳殼

麩炒
去瓢

葛根

四味各
二錢半

麻黃

半兩
去殼

山梔子

炮

甘草

炙上三味
各一錢半

右咬咀每服二錢水半盞煎至三分去滓溫服不拘
時候

如聖青金丸 治小兒肌體壯熱夜多驚啼及發吐逆

日久不解或瀉或祕變成慢驚或作疳疾定搐搦除

疳氣墜痰涎鎮心神

龍腦

研一錢

麝香

研一分

膩粉

各一分

香墨

研一錢

蘆薈

研各一錢

白麪

三錢

金箔

銀箔

各十片

史君子

四枚

以麪裹煨

令麪香熟去麪

取杵末

右同研令勻滴井水為丸如鷄頭大實大患慢驚用薄荷化水下三歲以上服一九已下半丸服訖便睡

覺逐利動立愈後隔三五日一服些小驚著或急驚
及覺身體熱但服之取下青涎為效量兒大小加減
服之一方無蘆薈

治小兒壯熱浴方

白芷

二兩

苦參

三兩

右都研剉以水一斗煎至七分去滓加少鹽及入少
鹽漿水浴畢以粉摩之即不畏風又大引散諸風也
治小兒壯熱 用棗葉湯浴蛤粉撲之

二黃犀角散

治小兒身體溫壯心神不安大臟秘熱

一名犀角散方
見本門溫壯類

調中湯 治小兒春和月晨夕中暴冷氣析其四肢熱
不得瀉則壯熱冷氣入胃變下利或欲赤白滯起數
多小腹脹極壯熱氣脉洪大或急數者服之熱便歇下
瘥也但壯熱不吐下者亦主之

葛根 黃芩 茯苓 桔梗 芍藥 白朮 藁

本 甘草

各六銖

大黃

六銖

右咬咀以水二升煮取五合服如後法兒生一日至
七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分
三服十六日至二十日取二合分三服兒生二十日
至三十日取三合分三服生三十日至四十日取五
合分三服恐喫五合未得更以意斟酌百日至三百
日兒一如龍胆湯加之

牛黃散 治小兒身體壯熱心肺煩壅

牛黃

細研
半分

黃芩

梔子仁

各一分

甘草

炙微赤剉
碎半兩

龍

腦 犀角屑 寒水石

各一兩

麝香

一錢
細研

右為散入牛黃麝香同研令勻每服以竹瀝調半錢
服量兒大小以意臨時減增

清涼丹 治壯熱連滯

白芍藥

半兩

黃芩

一分

犀角末

一分

鬱金

一分

硃砂

半兩

水飛天

竺黃

一分

麝香

一錢

龍腦

一錢

研

錢

右研拌勻煉蜜和九鷄頭實大每服一粒至二粒煎
人參湯化下

龍腦散 治小兒壯熱心神煩躁夜卧狂語

龍腦

一錢
細研

牛黃

一錢

黃連

一分
去鬚

犀角屑

羚羊角屑

琥珀末

甘草

炙

玳瑁末

鐵粉

細研各
半兩

右為散每服用蜜水調下半錢量兒大小以意加減

人參湯 治小兒壯熱面赤唇口焦乾大小便不通四

肢掣動啼哭或發渴

人參

三分

柴胡

去苗
一分

大黃

剉炒
一分

升麻

半兩

芍藥

二分

山梔

子仁

半兩

甘草

炙
兩

鈎藤

半兩

右搗粗篩每服一錢水七分煎取四分去滓溫服

茯神九 治壯熱驚痰壅直視

南星 胡黃連 天麻 各三錢 青黛 二錢 茯神 三錢 牙硝

硃砂 各二錢 麝香 一字

右為末用粟米糊丸如桐子大每服一九石菖蒲荊芥煎湯化下

犀角散 治小兒壯熱口乾煩不欲乳食宜服之

犀角屑 一分 黃耆 對各一分 黃芩 半兩 麥門冬 去心焙 柴胡

半兩
去苗 川升麻 半
甘草 炙微赤剉
各半兩

右為散每服一錢水一小盞入淡竹葉七片煎至五
分去滓量兒大小分減溫服

人參散 治小兒壯熱心神不安

人參 去蘆 五錢 鈎藤 半兩 赤茯苓 半兩 川升麻 半兩 犀角屑 一分

山梔子 一分 甘草 炙微赤 剉一分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大
小分減不計時候溫服

寒水石散 治小兒壯熱不解宜以粉之

寒水石 川芒硝 赤石脂 石膏 滑石 甘

草

川大黃

各一兩

右為散每用粉兒身良

蘆根散 治小兒壯熱兼嘔渴不止

蘆根

判

麥門冬

人參

各半兩

知母

焙一兩

右粗搗篩每二錢水一盞入生姜少許擘破同煎至

五分去滓日溫三服量兒大小以意加減

龍胆湯 治小兒四五十日服藥下後身壯熱如火傷寒更煎腹滿頭腫此皆內有伏熱

龍胆

去根

冬葵子

威蕤

大青

柴胡

去苗各

一分

赤

茯苓

去黑皮

甘草

炙各半兩

右粗搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓分為三服如人行十里已來一服隨兒大小加減

芍藥湯 治小兒身體壯熱心腹脹悶不思乳食漸漸羸瘦

人參

去蘆頭

赤芍藥

桔梗

去蘆頭

地骨皮

杏仁

湯浸

去皮尖蛤粉炒
五味各半兩

木香

檳榔

甘草

微炙上三味
各二兩半

右件咬咀每服二錢水半盞煎至三分去滓溫服不

拘時候

龍胆飲 治小兒壯熱脹滿不飲乳

龍胆

去根犀角

鎊屑各半兩

升麻

天麻

甘草

炙

鼈甲

去裙襖醋浸炙
黃色各三分

檳榔

煨剉一枚

右粗搗篩每服一錢水半盞煎至三分去渣分溫服

鉤藤飲 治小兒壯熱不安

鉤藤 升麻 甘草 炙 人參 各半兩

右粗搗篩每服一錢煎至五分去渣溫二服空心午
後各一服隨兒大小以意加減

山梔子湯 治小兒八九歲痰實壯熱

山梔子仁 黃芩 去黑心 前胡 去蘆頭 甘草 生用

右等分粗搗每服一錢水一盞煎至五分去渣溫服
日三兒大小加減不計時候

龍齒散 治小兒百日以来結實壯熱兼驚宜服之

龍齒 梔子仁 枳殼 甘草 朴

麩炒微黃去瓢

炙微赤剉各一分

硝 川大黃

三分半兩剉研微炒黃

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大

小分加減

芒硝散 治八九歲兒臟結實壯熱

川芒硝 赤茯苓 木通 大黃 黃芩

各三分

剉一兩

研炒三分

甘草

一分炙兩微赤剉

右為散每服一錢水一小盞入生姜少許葱白三寸煎至五分去滓隨兒大小加減溫服

蕪氣湯 治四歲小兒壯熱

大黃

五分

麥門冬

去心

甘草

各三分

細辛

二分

甘竹葉

一合切

黃芩

四分

右水三升煮一升二合一服日再二三歲兒量加減

竹瀝葛根湯 治五歲兒壯熱發疹已服湯煎九尚時

熱不消

竹瀝

一升
二合

生薑

汁五合
洗淨

牛黃

三大黑豆大
研末入汁內

右四五歲為四服六七歲為三服月內兒與米合出
月與一合百日兒三合

虎睛九

治小兒蓐內及百日已來壯熱多驚

虎睛

一對酒浸
微炙取仁

牛黃

麝香

硃砂

雄黃

各一分

右同研令細煉蜜和九如菉豆大以乳汁研服五九
隨兒大小以意加減服之

甘草摩膏

治新生兒肌膚嫩弱易為風邪所中身

體壯熱中大風手足驚掣

甘草

防風

各一兩

白朮

桔梗

各二錢

雷丸

二兩半

右咬咀以不下水猪肪一斤煎為膏以煎藥微火煎之消溶開濁膏成去渣取如彈丸一枚灸手以摩兒百過寒者更熱者更小兒雖無病早起常以膏摩顙上及手足心甚辟寒風治百日兒患壯熱氣急唯歇眠眼不開小便黃赤加水銀如豆大一枚日十度三日瘥止不瘥更摩水銀大冷切宜消息用也

治小兒壯熱

出本草

以生子者雌棟樹皮煎湯浸洗服食

祛熱湯

治小兒百日已來結實壯熱驚

大黃

炒

朴硝

甘草

炙

龍齒

各一兩

枳殼

去瓢

炒

一兩

右粗搗篩每服半錢煎至三分去滓溫服時與一分

日三服乳母服之亦妙

白餅子

一名珠九

治壯熱有痰及多溫壯夜卧不穩喫食

過多

滑石

輕粉

半夏

浸七次

天南星

湯浸七次

各一錢

巴豆

二十个去皮以麥
一升水煮盡為度

右研巴豆後入衆藥以糯米飯為丸如菜豆大捏作餅子三歲以上三五餅子以下三餅葱白湯卧服一方瀉利用米飲下食葱湯下如膈上有食即吐出食如在中脘即瀉下驚悸薄荷荊芥湯下

清水香浴湯 治小兒壯熱羸瘦

清水香

四兩

麻子仁

竹葉

各一升

虎睛

五兩

白芷

三兩

右咬咀以水二斗煮取一斗稍稍浴兒

地黃煎 治小兒壯熱心煩眠卧不安

生地黃汁

錢一

白沙蜜

合三

酥

合三

生麥門冬

取汁

三合

右於銀器內慢火熬如飴糖每服半匙熟水化下燈心湯亦得

紅龍散 治小兒壯熱不解及驚風熱等疾

牙硝

一分以合子內固濟火煨通赤先掘一地坑子先傾甘草水令溫後以紙襯藥入坑子內

一宿取出
所未用之

硃砂

研一錢

乾蝎

七個

龍腦

半錢

右細研每服半錢或一字參苓湯調下驚熱冷水調

下熱甚者冷水研生地龍汁調下

輕粉散 治小兒壯熱驚風

天南星 半夏 滑石

各一錢

巴豆霜

一字

右為細末輕粉半錢研勻麪糊為丸如粟米大每歲三粒三歲七粒用葱湯下

子芩散 治小兒胸壯熱

子芩 升麻 龍腦 大黃

各三分

右以水二升二合溫一日服盡利三二行乳母忌熱

麴動風物

犀角湯 治小兒熱不除

犀角

鎰半兩

升麻

一分

大黃

剉炒一分

石膏

搗研三分

右以三味粗搗篩入石膏拌勻每服半錢水半盞煎至三分去滓放溫相繼三服隨兒大小以意加減

大青湯 治小兒服藥吐利後身壯熱精神昏慢或微利而內有結熱

大青 大黃 甘草 麻黃

右粗搗篩二三歲兒每服半錢煎至叁分去滓食後
相繼三服仍隨兒大小以意加減

大黃丸 治小兒滯結壯熱

川大黃

一兩剉
研微炒

赤茯苓

鼈甲

塗酥炙黃去
裙襴各半兩

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服以粥飲
飯下五丸每日空心午後各一服量兒大小以意加
減

溫壯 附論

夫小兒溫壯者由臟腑不調內有伏熱或挾宿寒皆搏於胃氣足陽明為胃之經主身之肌肉其胃不和則氣行壅澀故蘊積體熱令兒多睡名為溫壯小兒大便秘其糞黃而臭此腹內有伏熱宜將服龍胆湯若糞白而酢臭則挾宿寒不消當服紫雙丸輕者少服令默除之甚增令微痢皆當節乳哺數日令胃氣和若不節則病易復其胃氣令腹滿再三利尚可過此傷小兒矣

方

竹葉湯 治小兒五歲溫壯腹中急滿臭不利或有微

腫亦主極羸不下飲胸痞手足逆冷

竹葉

切一升

小麥

半升

甘草

炙

黃芩

芡實根

澤瀉

茯苓

知母

白朮

大黃

各一錢

生薑

半兩

桂心

二銖要

瑞用三錢

麥門冬

半夏

各二兩

當歸

十八銖

人參

三兩

右咬咀以水七升煮小麥竹葉取四升去滓內藥煎

一升六合分四服

消滯丸 治小兒熱疾後腹中不調飲食不節腹滿溫

滿及中客忤煎乳冷有所為停滯一名雀屎丸

雀屎白

牛黃

研各一錢

芫薺

芍藥

乾姜

甘草

炙各半兩

麝香

研

小麥麴

大黃

剉炒研

當歸

焙

人參

三分

右為末煉蜜和丸如麻子大火溫熟水下三九欲下

都服五九一方加黃耆黃芩

各二分炒

柴胡湯 治小兒脇下實股惕惕已發溫壯傷寒

柴胡

當歸

辛細

各三分

黃芩

大黃

升麻

五味子

紫苑

各二分

牛黃

杏仁

四十個去皮炒

右切以水五升每服二合日進三服夜二服量兒大小以意用之一方無牛黃以麝香代之

竹葉湯

治小兒夏月患腹中伏熱溫壯往來患下痢

竹葉

切

小麥

去泥土
五合

黃芩

一兩
六銖

茯苓

去
皮

柴胡

人

參

麥門冬

甘草

炙各
半兩

右咬咀以水四升煮竹葉小麥二升去竹葉小麥再下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯熱炙手洞下黃澹氣力憊然脉極數用此方加大黃二兩

再服得下即瘥

胡黃連散 治小兒溫壯常欲飲水

胡黃連 犀角屑 牛黃

細研入

龍胆

去蘆頭

川大黃

炙微知母 研各二錢 麥門冬 半兩 去赤剉 心焙

右為散每服以沙糖水調下半錢量兒大小以意加

減

牛黃丸 治小兒溫壯驚熱

牛黃 天竺黃 腦麝

並細研

熊胆

各一分

犀角屑

胡黃連

末

山梔子仁

末

郁李仁

湯浸去皮
研各半兩

右同研令勻以糯米粥和丸如麻子大不計時候以薄荷湯下三九量兒大小以意加減

生犀牛黃丸

治小兒風邪溫壯發熱驚搐頭痛痰涎

犀角屑

一分

牛黃

要研極細

龍腦

各一分

麝香

各半錢研

天南星

牛胆內
搗者末

藿香藥

為末各
二兩

甘草

末

雄黃

各半兩研

右合研如粉煉蜜和丸如鷄頭大每服一九不計時候薄荷湯下

柴胡湯 治小兒腹中伏熱溫壯往來一名柴苓散

柴胡

去蘆豆三分

黃芩

去黑心一兩

人參

甘草

炙

赤茯苓

去黑皮各半兩

麥門冬

去心半兩

右咬咀每服一錢水七分小麥五十粒竹葉十片煎四分去滓溫服量兒大小加減服之

麝香丹 治溫壯

人參

去蘆頭

胡黃連

鈎藤

赤芍藥

每一分

右為細末次入好麝香一錢牛黃半錢拌糯米粥和

九黍米大每服五粒至七粒煎陳橘皮湯下不拘時

天南星丸 治挾熱痰盛溫壯夜卧不穩

天南星

泡為末

半夏

湯浸七次焙為末

膩粉

研

滑

研各一分

巴豆

二十四粒去心以水浸一宿不出油

右先研巴豆令熟次下藥末以糯米粥和丸如菜豆大每服三十九更量兒大小加減瀉痢米飲下取食葱湯下驚悸薄荷荊芥湯下

清涼飲子 治小兒多溫壯熱實及兒頰赤渴五心煩

躁睡卧不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令
兒血氣不理腸胃不調或連滯欲成伏熱或欲發驚
癇或風熱結核頭面瘡癰目赤咽痛瘡疹餘毒一切
壅滯並宜服之

大黃

四兩

甘草

炙

當歸

芍藥

右水一升六合煮取八合分為三服此方四味飲而
元和紀用經乃有療小兒百疾加減四味飲仍云自
四味飲以下紫九等方謂之有嬰七寶紫陽道士一

名保子七聖至寶方專一書者此方也此飲理小兒
胎寒腹脹痛乳哺不時溫壯發熱吐利不常諸驚掣
縮二十五癩肌膚喜瘡遇時而發作口瘡惡核赤目
黃瘦大小變蒸用芍藥白者赤者各半如宣泄即用
純赤者生用二分癰疫溫壯肺邪不利寒熱時加二
分通用四分也利小使用赤色者及驚狂瘡疥赤目
瀉血當歸肉多枝少氣香者生用二分欲血脈流暢
不為瘡瘍惡核者及止腹中痛胎寒腹痛啼聲不已

者加二分通用四分也如理寒熱破積解溫壯以下
加大黃如牛舌緊硬用蜀中者如欲泄痢宣蕩推陳
去熱即用河西錦紋者生用二分葛氏元用四分紫
陽保子方減二分下利者又減一方只用一分也甘
草赤黃斷理滕而易折者炙剉二分虛熱者加一分
通用三分也及解煩止渴寒熱邪氣大能安神定驚和
而不寒有國老之號也四味以水三升煮去滓月內
兒服一杏核量之日三百日兒服一粟殼量之日一

二三歲兒粟穀量之為一服日三歲兒以上隨大小
增之兼乳母服尤良依上法增減正藥外若發驚及
溫壯外有冒寒邪以去節麻黃一分水三升煮去味
去滓內正藥如本方服之者若驚風反折戴眼掣縮
加細辛四分內一料正藥增水至四升煮取一升五
合若中風身體強戴眼者加獨活二分內一料正藥
中水如正方煎服大神驗

二黃湯 治溫壯

大黃 黃芩

各四分

甘草

三分

細辛

二分

右水五升煮取一升二合三服此方小兒數服不瀉
若卓驚加鈎藤二分大效胡治云此治兒有病大效
牛黃散 治小兒溫壯身體常熱不止

牛黃 甘草

細研

炙微赤剉

梔子仁

子芩

柴胡

去苗

龍胆

去蘆頭
各一分

右為散入研藥令勻每服半錢以金銀溫水調下不
計時候服量兒大小臨時分減服之

升麻湯 治小兒溫壯不解

升麻

柴胡

去蘆頭

麥門冬

去心焙

黃芩

去黑皮

甘草

炙

各半兩

人參

黃耆

剉各一兩

右粗搗篩每服一錢以水八分煎取五分去滓量兒大小分加減服

黃芩散

治小兒溫壯或下痢之後而熱不除舌大不

能含乳胸中有痰作聲口中生瘡妨乳兼驚悸搐搦宜服

黃芩

一兩

鈎藤

半兩

甘草

炙微赤

川芒硝

半兩

川大黃

剉研

研

微炒

蛇蛻

三寸

一兩

炙黃

右為散每一錢以水一小盞煎至五分去渣入牛黃

少許量兒大小分減溫服

犀角散 治小兒身體溫壯心神不安

犀角屑

鈎藤

黃芩

梔子仁

川大黃

剉研

半兩

甘草

一分

微炙

剉研

右為散每一錢水一小盞煎五分去滓量兒大小分

減溫服

天竺黃散 治小兒健驚溫壯不可喫乳

天竺黃

細研

鈎藤

赤芍藥

人參

去蘆豆

甘草

炙微赤剉

牛黃

細研各半兩

右為散入研藥更研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒大小以意加減

七寶散 治小兒溫壯伏熱傷寒煩躁面赤氣喘夜熱

曉涼

當歸

芍藥

甘草

炙

大黃

蒸熟
一錢

麻黃

去節
三分

白朮

炒 荊芥穗 各二錢

右細末每服半錢至一錢水半盞葱白一寸薄荷一葉煎至三分溫溫併三服要瀉熱服

百病飲子 治小兒多溫壯熱實

大黃

四分

甘草

炙

芍藥

各二分

右以水一升六合煮取八合分為三服

五味子湯

治少小有熱服藥大下後身溫壯胸中有

結熱及治傷寒病久不除瘥後復劇瘦瘠骨立

五味子

分三

黃芩

柴胡

芒硝

麥門冬

去心

黃連

石膏末

分各二

甘草

炒

當歸

分各一

大黃

分四

右水二升七合煮一升三合去滓內芒硝令洋二百
日兒服三合日進三服夜一服有痰必吐得下便止
一方有前胡無柴胡

煩熱

附論

夫小兒臟腑氣實血氣盛者則表裏俱熱若然煩躁不

安蕪皮膚壯熱也

方

大青散 治小兒氣壅煩熱心躁目赤

大青

半兩

川大黃

半兩 微炒

牛黃

半錢 研細

硃砂

研細

甘草

炙

犀

角屑

玄參

川升麻

梔子仁

各一分

右為散入研了藥都令勻不計時候以沙糖水調下半錢服量兒大小以意加減

黃芩散 治小兒臟腑壅實心神煩熱睡卧不安

黃芩

川大黃

剉微炒

甘草

炙

川芒硝

麥門冬

去心

石膏

各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣量兒大小以意加減不計時候溫服

人參散 治小兒煩熱多驚

人參

一分去蘆

天竺黃

一分細研

甘草

半兩炙

鈎藤

一分

牛黃

半分

細研

右為散不計時候煎竹葉湯調下半錢量兒大小以

意加減

龍胆丸 治小兒心臟氣壅煩熱悶亂

龍胆

一兩
去蘆

黃連

一兩
去鬚

鉛霜

半兩
細研

牛黃

一錢
細研

鐵粉

一分

細研

右為末都研令勻以粟米飯和丸如菉豆大不計時
候以薄荷蜜水下五九量兒大小以意加減

犀角散 治小兒煩熱昏悶多睡

犀角屑

半兩

青黛

一分

硃砂

一分

蛇蛻

錢一

右為散每服以溫水調下半錢量兒大小加減服之
一方有代赭一分

硃麝散 治小兒煩熱昏悶多睡

青黛

三分

乾地龍

七條微炒為末

麝香

半分

硃砂

一分

右研為散每服以飲調下半錢量兒大小加減服之
治小兒寒熱噦方

用好乳二合姜汁一合銀器中慢火煎過五六沸一
歲兒飲半合量兒大小加減服之

治小兒煩熱驚風 以慎火草即景天草水煎洗浴

潮熱 附論

夫小兒潮熱者身體發熱作止有時故謂之潮熱由保養失宜風冷邪氣客於分肉之間每於衛氣至則真邪相搏故令發熱若欲知在何經絡當觀間甚之時屬何臟腑各循其經以調之 治潮熱五者一因傷寒之後餘毒不解或潮熱宜服脫甲散兼小柴胡湯二因痞氣有塊陰陽不均成潮熱先服黎漿飲次三後煎九三癥

積食傷冷滯脾胃不和成潮熱先服脫甲次塌氣下之
後調胃四陰陽不和臟腑虛怯成潮熱或冒暑濕脾瘧
成潮熱單服煨姜散五瘡疹後餘毒不鮮成潮熱宜服
大連翹飲子更與助胃氣潮熱謂熱來之有期或一日
一發或二日一發不越三日先寒後熱正定來者易治
亂日者難理痰起脾胃即是瘧候同出而異名又有單
熱潮發久作疳長作癥積滯痞氣皆脚冷肚熱者便與
下之須量熱輕重分數而利有蟲多者取之少則安之

取蟲宜在於春旺冬實之時其或兒壯蟲盛不拘此說

方

大連翹飲

治證在前論

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

炒紅

芍藥

各一兩

山梔仁

木通

川當歸

防風

各半兩

黃芩

去心

荊芥穗

各一兩

柴胡

去蘆

甘草

炙各二兩

蟬蛻

去足一分

右咬咀每服一大錢水一小盞煎取半盞風痰熱變

蒸熱麥門冬去心前實熱單熱加大黃燈心煎瘡疹

熱未出前已出後紫草當歸煎胎熱肺熱傷寒後餘
毒熱瘡疹餘毒熱加薄荷煎癰癤毒熱加大黃朴硝
煎此藥解利心經邪熱心與小腸受盛小腸乃水竇
常宜通利壅則結滑則脫熱則澀盛則淋平涼心經
三焦自順不得疾作而解證成而療者踈怠有之矣
一五味加湯使在前纔覺蘊熱寒邪風邪胃入肺經
心將之心不受觸傳於小腸或閉或澀或赤或白淋
澀不通榮衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼

目腫赤唇口白瘡津液不生唾涕稠盛雖在表裏但
得其宜驚風悉皆能散化痰熱亦自消除連翹之功
不虛設尔

梨漿水飲

治證在前論

柴胡

人參

黃芩

去心

前胡

秦艽

去土

甘草

炙

青

蒿

取在頭用童子小便浸一二次日就為度

右件等分每服一錢水一小盞入生藕生梨梨條亦
得薄荷二葉生地黃一寸同煎至半去滓通口空心

食前服兩滓併煎作一服一歲兒半錢此方治脾積寒熱其狀如瘡乃由脾氣陰陽相盛故也其寒在先陰盛於陽其熱在後陽盛於陰陰陽循之經絡傳歸於本依前復作不越三日而止重則頭疼嘔逆久則二三歲不歇左脇有塊小者如桃李大者如杯碟治法下去癥積痞塊自消然寒熱亦未能自解宜先與服梨漿飲連渣併三服定去寒熱了方可下積問之藥性寒涼何以禦之荅曰所謂先寒後熱猶陰陽勝伏

通相更變陰積陽虧逆虛愈重所服梨漿飲以毒攻
毒藥以青蒿以寒禦寒其熱不有寒必無加自然榮
與衛和陰與陽合寒熱再潮未之有也梨漿之攻妙
哉絕倫稍能知用無不獲安若患三載不過服兩服
曾經十年只此方妙用至純使人飲歎而已

犀角散 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有
盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末

地骨皮

麥門冬

枳殼

去穢
麩炒

大黃

蒸

柴胡 茯苓 赤芍藥 桑白皮 黃耆 人參

鼈甲

塗醋炙焦
各半分

右粗末用每服二錢入青蒿少許水煎量兒大小加減一方有秦艽無大黃

人參柴胡湯 治小兒潮熱不解飲食不長肌肉

人參

柴胡

去苗

甘草

炙

白茯苓

去黑皮

芎藭

各一兩

知

母

焙

升麻

藁本

天門冬

去心焙

各半兩

獨活

去蘆頭

栢

子仁

研各一分

右粗搗篩每服一錢水半盞入生姜二片青蒿一穗
同煎至三分去滓食後溫服五歲以上十五歲以下
入醋炙鼈甲半兩每服二錢水一盞煎六分服

柴胡飲 治小兒潮熱

柴胡

去蘆半兩

人參

知母

焙

羚羊角

鎊

甘草

炙

陳橘

皮

湯浸去白焙

赤茯苓

去黑皮

半夏

湯浸七遍去滑焙

木通

剉

藥

各等分

右粗搗篩每服一錢水一盞入姜一片同煎至五分

去渣溫服日二

白鮮皮湯 治小兒潮熱

白鮮皮 人參 白芷 防風 黃芩 知母

去黃芩皮 去黑

焙

沙參

犀角

半兩 各

甘草

炙一分

右粗搗篩每服一錢水八分入薄荷三片煎五分去渣分溫二服

青蒿湯 治小兒潮熱

青蒿

焙

知母

焙

甘草

炙各二兩

半夏

湯浸七遍洗汁製一分

常山

當剉焙

鼈甲

醋炙黃
去裙襴

枳殼

去瓢
麩炒

秦艽

去苗切
各四兩

二兩

右粗搗篩每服半錢水半盞入生姜一片烏梅肉少

許同煎三五沸去渣溫服

犀角湯 治小兒潮熱骨蒸羸瘦久咳嗽喘

生犀角

鎊半
錢

柴胡

去苗

秦艽

去苗土
各一兩

白朮

赤茯苓

去黑
皮

朱香

各半
兩

甘草

炙一
分

右粗搗篩每服一錢水七分入小麥三七粒同煎至

六分去滓溫服日三

二連丸

一名猪胆丸

治小兒血熱每日午間發熱遇晚則涼

胡黃連

宣黃連

赤芍藥

各半兩

右為末獺猪胆汁和成劑入在胆中懸胆用漿水煮
熟取出飯為丸如小豆大三十九丸米湯送下日三
服無時又有瘰癧證相似兒多鼻結洩瀉或腹中氣
滿或時嘔逆宜服之

秦艽散

治小兒潮熱減食蒸瘦

秦艽

去頭切焙

甘草

炙各一兩

甘薄荷葉

半兩切焙

右為粗末每服二錢水一鍾煎至八分食後溫服

銀棗湯 治小兒潮熱往來睡多盜汗肌體瘦弱久不

瘥者

麥門冬

去心

地骨皮

遠志

去心

人參

去蘆頭

白茯苓

去皮

甘草

炒

防風

去蘆頭切上

紫石英

錢一

石膏

錢一

羚羊

錢一

角龍齒

錢二

錢

右件每服二錢水六分煎至四分去渣溫服乳食後

臨卧服

天竺黃散

退熱理驚解唇紅面赤煩躁焦啼

瓜根

甘草

鬱金

天竺黃

連翹

防風

牙硝

別研各等分

右為末每一錢潮熱燈心茅根湯下急驚竹葉湯下

黃鷄煎丸

治小兒潮熱肌瘦盜汗

黃連

去鬚二兩

鶴虱

蕪荑仁

各半兩

秦艽

去苗土

柴胡

去苗

知母

焙各一兩

史君子

去皮一兩

右搗為末以黃雌鷄一隻重斤許者籠之食以麻三

候五日去毛令淨於項下開竅去腸肚洗淨乾入前藥末於腹內以線縫之取小甌先以黑豆鋪甌底厚三寸安鷄在甌內四旁以黑豆圍裹上以黑豆寸半蓋之自己時炊至申時住候取鷄去腹中藥及筋骨起以淨肉研和得所更少入酒麵糊丸如小菴豆大每服十九量兒大小加減空心臨卧麥門冬熟水疳瘦骨熱十五歲以上溫酒下

鼈甲丸

治小兒潮熱煩渴引飲脇腹滿脹羸瘦多汗

鼈甲

醋炙去
裙襴

黃耆

剉

柴胡

去苗各
一兩

枳殼

去瓤
銑炒

白朮

人參

各半
兩

木香

一分

右搗羅為細末浸炊餅心和丸如麻子大二歲兒十
九溫粥米飲下日更量兒大小加減服之

人參芎歸散 治小兒童虛勞關熱潮或遍身生瘡

北參

當歸

北前胡

柴胡

遠志

浸去肉
姜汁焙

地

骨皮

防風

北梗

半夏

各一錢半

川芎

茯苓

麥門冬

去心用
各二錢

枳殼

製一錢
半研

赤芍藥

一錢

甘草

三錢
焙

右剉咬咀每服二錢水一小盞姜三片紫蘇三四葉

煎服發瘡者兼服猪肚黃連丸

方見瘡類

別作小丸不惟

治瘡治渴其發熱而肚脹者米飲常服二十九

地骨皮飲

治小兒潮熱盜汗心忪及骨蒸勞熱

地骨皮

白茯苓

去黑皮

瞿麥穗

赤芍藥

山

梔子仁

生乾地黄

焙

甘草

炙各一兩

大黃

剉

柴胡

去苗

木通

剉各一兩

人參

木香

各半兩

青橘皮

湯浸去白焙一分

右粗搗篩每服一錢水七分入竹茹少許同煎至四

分去渣溫服不拘時候量兒大小加減

六合湯 治小兒血熱每日巳午間發熱遇晚則涼

當歸 大黃 川芎 熟地黃 白芍藥 柴胡

各三兩

一方加桂

半兩名琴飲子亦治頭熱身涼并五心熱名四順飲加川芎一倍

右為末一錢水半盞煎三分無時三歲用一錢

酸棗仁飲 治小兒風虛潮熱斷齒譫言

酸棗仁

一兩蛇蛻皮

炙三條

人參

羌活

去蘆頭各半兩

甘草

炙一兩

右粗搗篩每服二錢水一盞入薄荷三葉同煎七分去滓溫分三服量兒大小加減

百一羗活餅 治小兒潮熱

羌活

去蘆頭

芫薺

白殭蠶

雞蘇

各一兩

乾蝎

十四枚炒

右粗羅為末煉蜜和丸如鷄頭大捏作餅子每服一餅荊芥湯下

連翹湯

治小兒潮熱

方見嬰孩傷寒門夾驚傷寒類金連散

尅效散

治小兒潮熱往來久而不解煩渴昏倦肌瘦

減食

地骨皮

二兩

防風

去蘆一兩半

人參

去蘆

黃芩

甘草

炙

葛

根

四味半兩

右件每服二錢水半盞煎至三分去渣溫服不拘時

柴胡地骨皮湯

治小兒潮熱飲食不為肌肉黃痺夜卧

不安時有虛汗

柴胡

去苗

地骨皮

桔梗

焙各一兩

甘草

炙半兩

右粗搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓食後

臨卧溫服量大小加減

甘露飲 治潮熱乍來乍去潮熱心煩面赤口乾如瘧

寒水石 石膏 鬱金 甘草 薄荷

各半分

右為末每服一錢食後薄荷湯調下

牡蠣散

一名黃耆散

治血虛自汗潮熱

牡蠣 黃耆 生地黃

各等分

右咬咀每服二錢水半盞煎至三分去渣服一方加

浮麥煎

蜀漆湯 治小兒潮熱及百日兒壯熱氣息雖得歇眼
不開小便黃赤

蜀漆 甘草 知母 龍骨 牡蠣

各半兩

右咬咀每服水四升煮取一升去渣一歲兒少溫服
半合日再

保童九 治小兒肌瘦五心潮熱解骨熱長肌肉益氣

丹砂

研一分

大黃

剉炒

赤芍藥

梔子仁

各半兩

知母

切焙

一兩 人參

胡黃連

各半兩

鼈甲

去欄裙醋浸炙各一兩

右件除研外搗為細末入丹砂同研浸蒸餅為丸如菜豆大每服五九至十九溫蜜湯或人參湯下

通心飲

治心氣通小便退潮熱分水穀及治旋螺風

木通

去皮

連翹

瞿麥

梔子仁

黃芩

甘草

各等分

右剉散每服二錢水一盞燈心麥門冬煎春加蟬

蛻防風

夏加茯苓黃芩車前子

秋加牛旁升麻

冬加山梔子連翹

麝氣用鈎藤川練子加白茅根

竹葉 口瘡地黃野苧揚湯 旋螺風如赤腫而痛
者先用土牛膝澤蘭煎水洗



普濟方卷三百八十五

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百八十六
七

詳校官太醫院思種_臣袁天錫

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官進士_臣繆 瑛

校對官修撰_臣吳錫齡

謄錄舉人_臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十六 明

周王朱橚 撰

嬰孩諸熱痘腫門

執渴

大小兒血氣本自盛實腑臟之間易於生熱氣熏蒸液
津乾枯故令兒渴而引飲

方

天麻人參煎 治小兒上焦風熱熱渴引飲不止

天麻 人參

白茯苓

去黑皮 各一分

天竺黃

研一錢

甘草

生用 一錢

鉛霜白

研一錢

龍腦

研半兩

丹砂

研一錢

右將先四味為細末再入研了四味和勻煉蜜煎為膏每服一大豆許用金銀薄荷湯化下

枇杷葉湯

一名香冬散

治小兒上焦虛熱飲水不止

枇杷葉

去毛炙

葛根

胡黃連

甘草

炙

玄參

麥

門冬

去心焙 各等分

右粗搗篩每服一錢水一盞生姜一片煎至六分後

入蜜少許再煎至五分去滓放溫二服食後服之

苳蓐飲

治小兒熱渴或虛熱吐下除熱止渴

苳蓐

三分黃芩

去黑心一分

知母

焙

小麥

粟米

各半兩

右除粟米小麥外餘為粗末每二歲水一小盞入小麥粟米各一撮同煎至六分去渣分作三服一日喫盡量兒大小以意加減

麥門冬散

治小兒夏天服藥大下後胃中虛熱渴唯

飲水

麥門冬

去心焙

龍胆

各一兩

甘草

炙

黃芩

去黑皮各三分

葛根

剉一兩半

兩半

右粗搗篩每服一錢用水七分煎至四分去滓溫服
量兒大小以意臨時加減

黃連飲 治小兒多渴

黃連

去鬚半兩

冬瓜瓤

一分

右細剉水一盞半同煎至八分去渣分溫三服量兒
大小臨時加減

蓮實湯 治小兒熱渴不止

蓮實

三十枚炒
黃細研

浮萍一分

右用水一盞生姜少許煎至五分去渣分溫三服量

兒大小以意加減

黃蘆散 治小兒熱渴不止

黃連

去鬚
炒

蘆根

右細剉水一盞半煎至五分去滓旋與服

治小兒熱氣熏蒸臟腑煩躁津液枯渴欲引飲方

右取桑枝一握細剉水一盞半煎至八分去渣分作三服加熱水與飲

治小兒熱渴不止

右用葛根半兩細剉水一鍾煎六分去渣頻溫服

治小兒渴不止

蘆薈 扁豆藤 各半
兩 人參 一兩
去蘆

右細剉分為六服以水一小盞煎至五分去渣不拘時候量兒大小加減稍服

治小兒煩熱渴

以方諸向月取水飲之

葛根湯 治小兒體熱煩渴者尤宜服之

葛根

人參

各一兩

麥門冬

白茯苓

甘草

澤

瀉

各半分

右為細末每服一錢水八分入生姜二片薄荷三葉煎至六分去渣服

寒熱往來羸瘦

附論

夫小兒風邪客於皮膚痰飲積於臟腑使血氣不和陰陽交爭故發寒熱往來也胃氣挾熱則消穀消穀則引飲食陰陽氣血不和不能充養身體故寒熱雖能食不生肌肉也

方

鼈甲散 治小兒寒熱往來腹脹漸瘦不能飲食服之有效

鼈甲

一兩塗醋炙黃去裙襴

柴胡

去苗

訶梨勒皮

陳橘皮

去白

錢各三

檳榔

枚三

赤茯苓

子芩

赤芍藥

當歸

炒

川大黃

甘草

炙各半兩

右為散每服一錢水一小盞入生姜少許煎至五分

不拘時溫服量兒大小加減三服為度

柴胡散 治小兒寒熱往來乳食不下四肢無力心腹脹

滿上焦痰壅漸羸瘦

柴胡

去苗 鼈甲

塗醋炙黃去裙襴各一兩

人參

去蘆

赤芍藥

桔梗

去蘆

訶梨勒皮

地骨皮

杏仁

湯浸去皮尖麤炒黃

前胡

去蘆

陳橘皮

去白

甘草

炙剉各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣不拘時

候溫服量兒大小加減

五味子散

治小兒寒熱往來不欲乳食羸瘦心腹脹

甘草

半錢炙

麥門冬

半兩去心焙

五味子

當歸

炒

人參

去蘆白朮

赤茯苓

桔梗

前胡

黃芩

各一分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣服日三

服更量兒大小以意加減

人參散 治小兒寒熱往來食少羸瘦

人參

去蘆

黃耆

柴胡

去苗

白茯苓

鼈甲

塗醋炙

去裙襴

木

香

各半錢

訶梨勒皮

二分

白朮

一錢

杏仁

一分

湯浸去皮

麩炒微黃

甘草

一分

右為末不計時以粥飲調下半錢量大小加減服之

馬通粟九 治小兒脇下有氣腹痛喘逆氣息難為往

來寒熱羸瘦不食

馬通內粟

細辛

紫苑

洗去土苗

杏仁

浸去皮尖麩

炒各三分

五味子

石膏

秦艽

去苗

白茯苓

半夏

湯浸七遍

各一分

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日

三服量兒大小以意加減

香甲散

治小兒寒熱往來肌瘦

木香

鼈甲

醋炙黃去裙
爛各一分

檳榔

三枚

川大黃

陳皮

去白柴胡

知母

甘草

當歸

各半兩
洗焙

右咬咀每服一錢水一小盞生姜二片煎至六分去

滓溫服量大小加減

黃耆丸 治小兒往來寒熱多汗心煩小便赤黃不欲

乳食四肢羸瘦

黃耆 麥門冬 去心 培 赤茯苓 白朮 黃芩 甘

草 炙各一分 柴胡 去苗 鼈甲 炙去裙襴 各半兩

右為細末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五九
日三服量大小加減服之

訶黎丸 治小兒寒熱往來頭痛嘔吐及乳癖

訶黎勒皮 木香 人參去蘆 赤茯苓 桂心 川

大黃

炙剉各半兩

陳皮

半兩湯浸去白皮焙

柴胡

去苗三分

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯下五九日三服量兒大小以意加減

檳榔九 治小兒乳食不節傷於脾胃致成往來寒熱時復嘔吐不欲乳食漸至羸瘦宜服

檳榔 丁香 桂心 人參去蘆各一分 川大黃剉 陳

橘皮

浸去白

訶黎勒皮

各半兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷生姜湯研下五九看兒大小加減

芍藥散 治小兒寒熱往來啼呼腹痛宜服

赤芍藥 寒水石 黃芩 當歸炒 甘草炙 桂

半兩

心一兩

右為散每服一錢水一小盞入生地黃半錢煎至五分去滓不計時候溫服量大小加減

柴胡散 治小兒寒熱往來面色萎黃

柴胡

去苗半兩

石膏

一兩

川大黃

炒

麻黃

去根節

秦艽

去苗恒

山

各一分

右為末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服日三服更量兒大小以意加減

莽草湯 治小兒寒熱往來不休不能乳食浴時避風乃愈

莽草

丹參

各一兩

菖蒲

蛇牀子

桂心

各半錢

雷

丸

一合

右都對以水五升煮至三升去渣適寒溫以浴兒宜避風冷

芍藥湯 治小兒寒熱往來

赤芍藥

一分黃芩

當歸

洗焙乾

柴胡

甘草

各一分

右咬咀每服一錢水八分生姜二片棗子一枚煎至五分去滓溫服量大小加減

秦艽湯 治寒熱往來

秦艽 鱉甲

醋炙微黃去裙襴

川大黃

微炒

麻黃

剉各半兩去根節

竹茹 甘草

各一兩

右咬咀每服水一盞葱白二寸煎五分去渣服量大

小加減

草菓飲 治小兒寒熱盜汗不思飲食面黃腹急

草菓

一兩

厚朴

二兩

甘草

棗子

各半兩

生姜

四兩 不去皮 同杵淹

一宿

焙

右咬咀三歲一錢水半盞煎至三分去滓一方治五

瘧夜明砂為末冷水調下半錢即效

鼈甲散

治小兒寒熱往來四肢羸瘦

鼈甲

三分塗醋炙黃

淡竹茹

川大黃

炒各一錢

恒山

一杏仁許大

右為散每服一錢水一小盞入葱白二寸煎至五分去滓入麝香豆大煎一沸溫服日三更量兒大小以意加減

生地黄散

治小兒寒熱往來啼呼腹痛

生地黄

桂心

各等分

右以水三升煮取一升週歲以下服二合以上服三

合一方七味有芍藥寒水石黃芩當歸甘草各半兩
地骨皮散 治小兒寒熱更作急體羸瘦煩渴引飲不
思飲食

人參

去蘆

白朮

白茯苓

去皮三味各一兩

前胡

地骨皮

當歸

洗焙

陳橘皮

甘草

半夏

麴

去蘆頭七

味半

兩

右件咬咀每服二錢水六分生薑一片棗一枚同煎
至四分去滓溫服不拘時候

寒熱結實 附論

夫小兒寒熱結實者此由風邪客於皮膚而內有痰飲積於臟腑使氣血不和陰陽交爭則發熱臟腑本實復為熱所乘則積氣在內使人胸脇心腹煩熱而滿大便難小便澀是謂寒熱結實也

方

柴胡九 治小兒寒熱結實或熱攻衝心肺氣急盡晝夜有汗日漸羸瘦不喫乳食

柴胡

半兩
去蘆

赤茯苓

一分
分人參

去蘆

木香

一分
分桂心

川

大黃

半兩
炒

枳殼

一分
麩炒

甘草

一分
分

鼈甲

半兩
塗醋炙
微黃去裙襴

右搗羅為末煉蜜丸如麻子大每服溫水下五九日

三服量兒大小加減服之

大黃丸 治小兒增寒壯熱發渴不定腹中結實不能

乳食

川大黃

半兩
炒

柴胡

一分
赤茯苓

木香

一分
分桂心

枳

殼

一分
麩炒

桃仁

一分
湯浸去皮尖炒黃

檳榔

半兩

人參

一分
去蘆頭

右為末煉蜜和九如麻子大每服以溫水下五九日
三服量兒大小加減服之

芒硝九 治小兒宿食痰癖寒熱臟腑結宜服之

川芒硝半兩 川大黃半兩 甘遂一分 半夏一分 巴豆洗七次

二七枚去皮心 杏仁二七枚去 代赭半兩
膜紙裏壓去油 皮犬別研

右為末與巴豆仁膏一處研勻煉蜜和搗二三百杵

九如菉豆大五六歲兒空腹以溫水下一九利為度

鼈甲散 治小兒寒熱結實脇下妨悶不欲乳食

鼈甲

半兩 銓醋炙黃

赤茯苓

半兩

川大黃

一兩 炒

枳殼

二十粒 麩炒

川朴硝

一分

右為散每服一錢以水一盞煎五分去渣溫服不計

時量大小加減

五靈脂九 治小兒腹有積滯致生寒熱腑臟結實心

腹氣脹食多少力

五靈脂

半兩

陳橘皮

三片湯浸去白

木香

半兩

川大黃

一分 炒

巴

豆霜

一分

右為末入巴豆霜同研令勻用軟飯和丸如黍米大
每服以粥飲下兩丸小兒一九

爽神湯 治小兒清寒壅爽精神

白朮

人參

去蘆

白茯苓

各一兩

桔梗

瓜根

甘草

各半兩

辛細

錢一

右咬咀每服一錢水八分入荊芥薄荷各少許煎至
五分去滓溫服

冷熱不調

附論

夫小兒冷熱不調者蓋為乳食乖度寒溫失節或陰陽相爭氣血不調致令冷歸下焦熱衝上膈若風冷入於腹胃則瀉痢不定或腹中氣滿或時嘔逆不能乳哺故謂之冷熱不調也

方

犀角湯 療小兒冷上熱下熱上冷下難將息方

犀角末 甘草 生地黃 芍藥 白朮 茯苓

梔子

各三分

柴胡 人參 大黃 生薑

各四兩

黃

苓

二分桂心一分

右咬咀水三升煮服一升分溫服之

木香散 治小兒冷氣不調胃氣壅滯少思飲食

木香

一分

大腹皮

一分

人參

赤茯苓

青橘皮

去白

訶

梨勒皮

桂心

前胡

半夏

丁香

甘草

各一分

分

右為散每服一錢水一小盞入生姜半片大棗一枚煎至五分去滓放溫量兒大小以意加減

犀角散 治小兒冷熱不調或時下痢腹痛不能飲食

犀角屑 桂心 甘草炙 當歸炒 黃連 陳皮浸去

白人參 乾姜炮各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣日三服
量兒大小加減

訶黎勒散 治小兒冷熱不調大便或壅或通不欲乳
食

訶黎勒皮半兩 人參一分 檳榔一分 木香一分 川大黃半兩

炒桂心一分川芎一分

右為散每服一錢水一小盞入生姜少許煎至五分去滓不計時候大小加減溫服

赤芍藥丸 治小兒冷熱不調不思飲食積不消

赤芍藥三分桂心一分柴胡去苗半兩川大黃三分炒赤茯苓

半兩 鼈甲一兩塗醋炙
兩 黃去裙襴

右為末煉蜜丸桐子大二歲以上粥飲化破三九日三服如四歲以上至七歲七九以粥飲下

白朮散 治小兒冷熱不調腹內疼痛發渴不定

白朮

半兩 當歸

半兩 芎藭

半兩 乾姜

一分

青橘皮

一分湯浸去皮

甘草

一分炙

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣不計時候量兒大小加減服之

當歸丸 治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛不欲乳食

當歸

炒

人參

去蘆

白芍藥

芎藭

甘草

炙

白朮

各半

兩

右為末麪糊和丸如麻子大每服以粥飲下五九日
三服三歲已上加九數服之

香連散 治小兒冷熱不調腹痛下痢

木香

當歸

微炒

乾姜

炮各一分

黃連

去鹽

阿膠

炒黃各半兩

右為散每服以粥飲調下半錢量兒大小加減頻服
木香丸 治小兒冷熱不調腹痛不可忍或時寒熱下

痢膿血

木香

一分

芫薺

當歸

剉炒

桔梗

去蘆

黃芩

各半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大不計時候以溫生姜湯

研破二九服之量兒大小以意加減

赤茯苓丸

治小兒冷熱不調腹胃滯結壯熱時作兩

肋刺痛

赤茯苓

川大黃

剉微炒

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襖各三分

當歸

川芎

各一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五九日

三服量兒大小以意加減

調氣散 治小兒四五歲腹內冷熱不調不能飲食

白朮

人參

去蘆

甘草

炙各三分

厚朴

一兩去粗皮姜製

右為散每服一錢水一盞入生姜少許煎至五分去滓服量兒大小以意加減

黃疸病

附論

夫黃疸以身皮皆黃者病也身痛體背強大小便澀一
面目指爪盡黃小便如屋漏色看物皆黃渴者難治

此黃疸也此證多得於大病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食吐渴者脾疸也又有自生身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯胃不和也黃疸者由脾氣實外有溫氣乘之與胃合候變生熱蓋脾色主黃胃為水穀之海熱搏水穀氣蘊積成黃薰發於外身疼轉背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃此或傷寒或溫病皆由熱不時解而入於胃也宣利者易治澀者難治宜服五苓散加茵陳

煎湯點又宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者承氣湯效 陽明病無汗小便不利心中熱壅必發黃凡發黃其寸口無脉鼻氣冷並不可治 凡發黃而下痢心腹滿者必死診其脉沉細者亦死又有百日半歲小兒非傷寒溫病而身微黃者亦是脾胃熱忌不可灸也灸之則熱甚此是將息過度所為微薄其衣數與除熱粉散之自歇不得妄語湯藥服及灸

方

犀角散 治小兒黃疸一身盡黃者

犀角

一兩 茵陳

瓜蒌根

升麻

龍胆草

甘草

生地黃

各半兩

寒水石

三分

右白水煎服一方治小兒忽發黃面目皮肉須盡黃

瓜根汁和蜜服

茵陳散 治小兒黃病身如橘色

茵陳

川芒硝

各一兩

梔子仁

川大黃

炒

黃芩

犀角屑

木通

剉

寒水石

各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎五分去渣不計時候
溫服量大小加減

瀉黃散

一名加減黃連散

治小兒體熱胸膈煩滿皮膚如潰橘

之黃白疳亦然濕熱所致也并治痿獨取於陽明證
也加減瀉黃散主之

黃連

茵陳

各五分

黃蘗

黃芩

各四分

梔子

茯苓

澤瀉

各三分

內經曰土位之主其瀉以苦又云脾苦濕急食苦以燥

之以黃連茵陳之苦寒除濕熱為君腎欲堅急食苦以
堅之故以黃蘗之苦寒除濕熱為君腎欲堅急食苦以
堅之故亦黃蘗之苦辛寒強筋骨為臣濕熱成煩以苦
瀉之故以黃芩梔子之苦寒止煩除滿為佐濕淫于內
以淡滲之以澤瀉茯苓之甘淡利小便道濕熱為使也
右呔咀都作一服水一大盞煎至六分去滓稍熱食
前一服減半時五日再服而愈

升麻丸 治小兒熱毒攻脾胃遍身俱黃小便赤澀大

便難心神疎熱兩目亦黃

川升麻 龍胆 梔子仁 黃芩 川大黃炒秦

芫 甘草

炙剉各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以新汲水研下三九三歲以上加丸數服

三黃丸 治諸黃兼治瘟疸最治衄血大便脫肛

黃連

去鬚一分

黃芩

去心半兩

大黃

去皮濕紙裹煨

右同細末麪糊丸如菉豆大或麻子大每服五七丸

至十五九二十九食後米飲送下一方用煉蜜為丸
如衄血膿鹽水下大便血荊芥薄荷湯送下一名三
黃散治黃病每服一錢水一盞煎五分去渣溫服食
後

白朮散 治小兒結熱於內口乾而渴身黃體重者

人參 白朮 白茯苓 甘草炒 藿香各一兩 葛根

右為粗末每服一錢至二錢水煎服

土瓜根汁方 治小兒黃病

土瓜根汁

右一二歲兒取半鷄子殼分二服三四歲取一鷄子殼分二服早晨晚後各一服一方用蜜半匙相和漸漸服之

茵陳九 治小兒脾胃熱毒致肌肉變黃小便變赤少心中煩懊

茵陳 梔子仁 川大黃炒 秦艽去苗 甘草炙各川

朴硝半兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候溫水下五九
量兒大小加減服之一方有郁李仁無甘草

瀉黃散 治小兒身涼身黃睛黃疳熱口臭唇焦瀉黃
沫脾熱口甜胃熱口苦不吃乳

藿香

錢七

山梔子

錢一

石膏

半兩

甘草

錢三

防風

四兩

右細剉同酒蜜微炒香為末每服半錢水半盞煎三
分去滓服清汁亦治弄舌一方每服一錢溫熱水調
下不拘時候服之

子芩散 治黃病每服一錢水八分煎五分去渣溫服

黃芩 瓜蘆根 茯神 各一兩 甘草 胡黃連 各半兩

蘆根湯 治黃病

蘆根 判一兩 茵陳 山梔子 黃芩 甘草 各半兩

石搗羅為細末每服一錢水八分入薄荷三葉煎五分去渣服

大黃散 治小兒諸黃

川大黃 炒 黃連 菰蘆根 黃芩 梔子仁 各半兩

右為散每服一錢水一盞煎至五分去滓不計時候
溫服量大小以意加減

黃瓜蒂散 治小兒諸黃三歲忽發心滿堅硬脚心手
熱則變為黃病不急治殺人

瓜蒂

二十枚

小豆

二十粒

糯米

四十粒

右搗羅為散吹少許入鼻中令黃水出殘藥末淨水
調服之得吐黃水即瘥一方瓜蒂一兩赤小豆四兩
為末每一錢溫水調服藥下便卧即當有吐以吐為

度出青黃汁為妙若小病不除者次日如前法更服
可再三不令虛也藥力過時不吐即服熱湯一盞以
助藥力若服藥過多者飲冷水解之又方瓜蒂炒
赤小豆各等分為末三歲半錢濃豉汁調下溫服不
吐少加得吐而止虛人不可用

茵陳湯 治小兒黃疸身體目睛小便並黃

山茵陳

一分大黃 剉炒

山梔子

五枚 用仁

右粗搗篩五六歲每服一錢水七分煎四分入朴硝

半錢更煎一兩沸去滓分溫日三服量大小加減

大黃丸 治小兒諸黃心胸壅悶宜服

川大黃

剉炒

茵陳

葶藶

隔紙焙令紫色各半兩

右為末煉蜜和丸梧桐子大不計時候以新汲水研下三九量大小增減服之

青麥汁方 治小兒黃病

青麥自然汁

右二歲兒取半鷄子殼分二服三四歲兒取一鷄子

穀分二服早晨午後各一服

葶藶丸 治小兒黃疸大小便難喘粗氣急

甜葶藶

一兩
炒

大黃

一兩
炒

右為末煉蜜丸如小豆大每服十九丸米湯送下

秦艽湯 治小兒身目俱黃

秦艽

三分

右粗搗篩每服一錢牛乳一合同煎至五分去滓分
溫日三服量兒大小加減

苦參丸 治小兒穀疸其候食必頭眩怫鬱不安而發黃

皆由失飢太飽攻衝脾胃腹滿氣粗煩渴

苦參

一兩半 龍胆

兩

右為末牛胆汁和丸搗三百下丸如菉豆大每服二十丸米湯下不拘時

雙連丹

名黃瓜丸

治小兒疸病渾身及面色俱黃

川黃連

去鬚

胡黃連

各一兩

右為細末用黃瓜一枚去瓢留一小蓋子入藥末內

後以蓋子蓋定麪裹火燒令麪焦去麪搗熟九如菜

豆大每服七粒至十粒溫水下大小加減

寒水石散

治小兒胃熱身體黃除熱粉之

方見本門諸熱類

逐黃散

治小兒黃疸脾熱眼黃

右以瓜萋青者焙為末每服一錢水半盞煎七分去滓服立效五更初瀉下黃極妙

韭根汁方

治小兒黃病

韭根汁

味溫無毒洗淨去泥不計多少於石器搗爛瀝取自然汁

右滴少許入鼻中出黃水即瘥

諸腫

附論

夫腫病腎熱傳於膀胱盛逆於脾胃虛而不能制腎水反尅土脾隨水脹脾主四肢故流走而身面皆腫也若夫喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土上勝心火心又勝肺為心尅故喘或問曰心勝肺肺本見虛今何喘曰此有二者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍侵於肺故大喘此皆難治腫者疳腫風腫氣腫積腫虛腫

五者大同小異疳腫者肌體浮腫通身明亮狀如熟李

寶鑑云若見皮膚如熟李此名疳水定無疑是也又風有陰囊腫似琉璃疳水也或因疳食傷脾變為疳水

腫者面目浮腫色帶紫赤時常多痒

陶隱君云風腫紫色而痒進退不定

忽時有發牽牛散主之或有如痛癰有成片腫者搔之隨手而起此風疹也素問云風邪客於肌中肌膚虛

真氣逆散寒搏於皮膚入腠理濕氣行之則為腫痒也又云面腫曰風癰雖氣血尚虛而熱未盡從皮膚興氣

相搏致令氣不宣泄故停留成腫也治之先益黃散補後牽牛散利之

氣腫者目胞浮腫

久嗽為之粗有痰

食公曰目上瞼先腫次面背腫者久嗽為之曰氣腫若下瞼先腫次面背

腫者脾積為之曰水腫

素問云目下微腫如卧蚕起之狀曰水腫熱論曰水者陰目下亦陰也腹者至陰之

所居也故水在腹中者必使目下腫也又曰經腫也又曰經腫曰水腫千金云有人患氣急久不瘥遂成水病

麻黃甘草

湯主之積腫者遍身浮腫因食悞脾久瘧亦爾

日華子有

云人久患寒熱不退必變浮腫因脾積氣所作也寶鑑云因宿痰飲成塊散後遍身浮腫喘滿或因不便食即

飲水悞必

虛腫者四肢浮腫久痢為之多渴少食

凡痢久不

退虛腫少食瀉久不退虛腫煩渴大抵痢久則脾土虛虛則不能制腎水反尅土故腐腫於肌肉也其病十死八九若用涼藥立死治之宜用益黃散及五苓散候脾氣實則腫自消十愈五六凡瀉久能變虛腫也

皆

由不忌生冷恣食甘酸脾腎不調之所致也然取水之法諸有水人微腫見於目下水者陰也腹者至陰之所

居故水在腹必使目下腫而不得卧卧則驚驚則咳甚
夫取水法不可頓收盡必當再發則難治如病甚治者
初隔一日一取候減三二分又兩日再一取候退六七
分又隔三日一取減去八九分又隔四五日取其不取
日即服補腎行水氣之藥

全嬰方云丁氏二子大者七歲自七月內寒熱四十餘日

小者五歲自七月內瀉痢四十餘日二子後來俱發腫
招愚視之大者水寶散瀉十餘行五苓散二服翌日病
除八九分後商陸散二服平愈小者益黃散女麴散五
苓散日二服三日服藥尚未見效主人曰大者服水寶
散立效何不投之一服答曰服之即死是謂醫之用藥
以療病如將之用兵料敵當其虛實隨其機變必獲勝

效也蓋大者因食傷脾小者因痢損脾素問云陽病治陰陰病治陽大抵退熱以寒藥退寒以熱藥實病虛之虛病實之今二子證候虛實不等若水實女麴服之交互二病俱亡小者止用益黃散服之十日脾實平安

腫脹二證此由虛中有積久患失治漸傳作證候傳化

多喘隨虛實按輕重察勝衰審表裏主治先固其本後

正其標得無恙矣凡腫有受濕

脚手面
目虛浮

毒氣腫

腹肚堅
蠱脹急

傷寒虛氣入腫腹氣虛腫瀉痢虛氣入腹脹腫血虛腫

榮衛俱虛腫凡脹有疳極脹疳積脹氣積痞氣脹癖氣脹

癥積脹鎖肚脹急膈脹中脘脹食腸脹蛔蟲脹脾氣

脹冷積脹虛積脹以上腫脹虛積並當下之用藥各有
法度凡受濕腫傷寒虛氣入腹食毒氣腫瀉痢虛氣入
腹腫此四腫所患病不相同皆因虛盛而得之受濕謂
脾胃受濕冷久不化氣浮四肢頭面皆腫食毒氣由
脾胃傷之冷積毒氣停留胃脘致虛入腹作腫傷寒由
下之太早乘虛入腹作腫瀉痢之久脾氣亦虛是以致
腫以上宜平調胃氣補臟克實方可去腫先服四味理
中九減半乾姜加白朮桑白皮同煎傷寒虛腫加枳實

作喘加淡豆豉利虛腫服正氣調胃胃氣既壯以致生
丹利之其腫即退再調補臟腑用觀音散良益固平復

矣又有氣虛腫

亦名氣毒

榮衛俱虛

亦名氣血虛

凡小兒所患腫

脹一門最為要急前人少有究竟然腫脹已作皆由榮
衛不順臟腑怯弱壅滯三焦流注百脉表裏俱虛邪正
相亂所以致受四大浮盛腹肚癰滿多由食毒得之飲
冷得之癰傷得之飲飽得之積久不化諸虛所入故成
斯病病由虛得或忘亂通下因虛致虛根不能去

盛是謂壞證智者怯而辭謝庸者暴以攻擊二醫不同
誠屬難治再與智者商之謂商量斟酌輕重良者審之
雖曰良工猶宜審其可否之意疑者謂之疑其病盛不
可利只宜與塌其氣也啟其靈明酌定良方起死回生
謹遵其理始可調治用藥至真對證剋效即無恙矣以
上先與服榮衛飲子次服分氣飲子小兒臟腑嬌嫩乳
食過傷脾胃虛冷不能消化乳食停滯腹間脾受積傷
脾土衰弱不能制水故溢漬於皮膚腫有三證疳水積

水驚水也蓋疳水者其候心中虛脚腫不可取宜用藥消之若積水者五積在於腹結化為水其候或冷或熱四肢頭面俱浮作虛積治之宜補而後取此是積在腹結後化為水其病難治而不可作虛中積治也驚水者前後重疊受驚致令心火躁渴飲水過多停積於脾其候四肢腫身上熱若其脉大者生小者死叔和曰水氣浮大得延生沉細當應是死別尺脉如絲或浮洪按之無根乃絕脉楊氏曰賈洛陽以腫為疔疾則知病之危

惡非他疾比也夫人全性命者水穀而已水則腎主之
土穀則脾主之惟腎虛不能行水脾虛不能制水胃與
脾合氣胃為水穀之海又因虛而能傳化故腎水泛溢
侵脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌
肉而發腫矣其候目胞上下微腫四肢重着咳嗽喘怔
忡股間清冷小便澀黃皮薄而光手按成窟舉手即滿
治法楊氏曰身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣
在裏可下次則通利小便順氣和脾不可緩也然證雖

可下當審虛實權輕重不可通用芫花甘遂大戟猛烈之劑用之太過吾恐峻決者易因閉者難水氣復來何以治之也凡虛腫先起於腹而散於四肢者可活先自四肢而後歸腹者不可治蠱脹肚上有筋腹滿大便滑泄久瘧而轉作虛浮及唇黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足平傷肺背平傷肺或男從足腫上女從身腫而下或肉硬或手掌平皆不治凡小兒通身浮腫是風水腫也小便不通者利之則愈內經曰三焦閉蓋水道不行水

滿皮膚身體痞腫是風乘之故可用長流水加燈心煎五苓枝時時呷之更於不透風處浴之汗出則腫消一汗減半再汗減七八三汗消盡內外俱行也治水之法當利小便得其要妙之理則愈矣 小兒浮腫有飲食所傷有濕傷皮膚有氣化為水治法當腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便然後調理脾胃也

方

榮衛飲子 調治嬰孩氣血俱虛榮衛不順四肢頭面

手足俱浮腫以至喘急者並宜服此

川當歸

熟乾地黃

洗淨

白茯苓

川芎

白朮

甘草

炙

白芍藥

枳殼

去穢炒

黃耆

蜜炙

陳皮

右等分咬咀每服二錢水一小盞煎半盞去渣通口

不拘時服

榮者氣溫流血於脉衛者氣順調和於絡是故榮衛脉行陰陽相實循環無止自幼以至

長不唯呼吸無少滯碍其脉方調其氣方順呼吸之間脉不應息氣有違滯流注經絡隱伏臟腑虛實熱則發壅疽背節實熱則患瘡疾癰疥况其榮與衛陰及陽偏枯有作易感寒邪亦易致虛百病皆由茲始此方最良雖兒幼小並可與服以杜其根使血榮氣衛順且和矣腑寒臟虛溫且壯也盈虧自然而平怯

弱自然而正陰陽
均調氣脉充實

分氣飲 調理小兒腫脹作喘氣短促急坐卧不任四
體浮腫飲食嘔逆神困喜睡宜服之

五味子 桔梗 白茯苓 甘草炙 陳橘皮 桑

白皮 草果去殼 大腹皮 白朮 枳殼去瓢切炒 川當

歸 紫蘇 蘇子 半夏麴

右等分每服二錢水一小盞生姜二片棗子半箇煎
半盞去滓通口服不拘時兼八味理中丸煎服以上

宜用救生丹通利

清濁無混邪正不干上焦得之清涼下部受之溫暖氣滯則少升

降血虛則多泄瀉雖是乳子呼吸一急其脉有志徐徐應指不違其數者亦同大人流行但通小大辨其短淺而已若留滯其脉遲數其間太過不及者作病善主療治鬱則分之逆則順之停則利之滯則降之調理之先宜通順其氣大抵嬰孩氣順即易治脉壯亦易理證候稍傳鬱逆停滯當先祛治不待傳入而究竟此方分氣預宜進與分水穀之治者為用不同

大效神功勅生丹

治小兒氣虛喘息四肢浮腫腹肚

脹急衝滿脇肋乍寒乍熱或瀉或秘皆由久停虛積

榮衛不順宜用此方去其毒惡之氣

雄黃

別研

硃砂

另研各一分

巴豆

二十粒去殼

乾姜

二錢

右用米醋一盞以巴豆姜就煮令乾去姜不用將巴豆出油和雄硃研勻雪糕搜九如麻子大每一歲三

九並用酒浸赤芍藥少許送下

夫幼兒受疾其來發端無過驚風痰熱疳

積吐痢而已前賢衆多述論證候遍看方藥究竟推詳各有確實與見其有無辜疳積異作證候著于篇集或有罕見其證未詳其理者盡難測知龜胸決肋飲漿是也又復有壞証惡候自服諸家九散輕重相投愈之不得全功聽之加為他害肝脾風之類是也悠悠既久方法何宜學醫之士遇此等証未審術窮而屈若能此等觸類調理雖則未效猶尚庶幾多是肆意免強而為稍或得失利害甚重今議初生丹方

載譚氏所療無辜積證效驗至良晚進後生聞而知之且驚且喜蓋渠未嘗知用若叅究而又意到即細切以副全功然後知醫學無窮神妙難言世俗醫工於此等證候須當至誠施議起死回生十治十全百發百中矣

療小兒身體滿氣急卧不得方

右用郁李仁一合搗末和麪搜作餅子如常法與兒喫微利即瘥一方為末六分水七合和調去滓煮粥與兒喫之

寬腹丸 治小兒疳氣腹脹不思飲食或面腫者

牽牛 蘿蔔子 陳皮 青皮 木香炮各 檳榔一兩

紫蘇子 木瓜半 巴豆七粒
炒黃

右為末糊丸小豆大三歲三十九紫蘇木瓜湯下

黃耆茯神散 治小兒榮衛氣虛精神不與面無顏色

唇口青白噦逆昏睡全不思飲食身體微腫

黃耆蜜炙 茯神去末 天南星炮 白扁豆炒黃 防風去蘆 白附

子炮 肉桂去皮 白芍藥 山藥各等分

右每服二錢水一小盞生姜三片棗一枚同煎七分

去渣食前溫服

加味五苓散 治腫滿因積而得既取積而腫再作小

便不利

猪苓 赤茯苓 白朮 澤瀉 木香 沉香

檳榔 各三錢 白豆蔻 一錢 硝砂仁 五錢

右味煎樟柳木通燈心湯調下

大黃湯 治小兒咳腫壯熱有實方

麝香

三銖別研湯熱下

大黃 四兩 甘遂

石膏

各三分

黃芩

甘草

青木香

各三分

前胡

四分

右為粗末水七升煮一升九合每服三合日四服夜

三服

塌氣散

治腫滿因積而得既積而腫再作小便不利

赤小豆

陳皮

去白

蘿蔔子

白朮

炒

茴香

炒

木

香

二錢炮

甘草

一錢炙

青皮

五錢去殼炒

去巴豆不用

以巴豆二錢

錢

右為末飯湯下或薑棗湯下治疳用燈心湯下

治小兒臍赤腫

以杏仁杵加脂內體中相和傅臍腫上

治男子婦人小兒積年脚氣腫痛及腹肚蠱腫服之痛

止腫消

方見大脚氣腫門

椒目飲 治小兒痢後虛腫并頭面浮腫或身熱

白朮 秦艽 椒目 甘草 香薷 通草

右等分為末一錢水半盞煎三分去滓食前不宜喫

蠱魚鯉魚二物皆能腫

史君子丸 治小兒面黃大小便赤徧身浮腫此脾疳食

積氣滯而成

史君子

一分麵裹
煨熟去麵

黑牽牛

一兩

五靈脂

半兩

黃連

陳

皮江子

七分粒同陳皮黃
連炒江子不用

右為末粟米糊為丸如菉豆大每服五七九生姜橘

皮湯下

神助散 治小兒頭面手足浮腫

澤瀉

猪苓

去黑皮
各二兩

黑牽牛

二兩半微
炒取末

葶藶

三兩
炒香

別椒目

一兩

木香

一兩

右為細末每服以葱白三莖將水一盞煎至半盞調藥三錢絕早面向東服如人行十里久漿水葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多少須啜一升許不得喫鹽并麪自早至午當利小便三升四升或大便利喘定腫減七分隔日再服

五皮散 治小兒諸般浮腫氣急不食

桑白皮 大腹皮 茯苓皮 薑皮 陳橘皮 各

分

等

右咬咀三歲一錢紫蘇皮葉三五片水半盞煎三分
去渣不拘時服

澤苓散 治小兒遍身浮腫氣急不食

木通

一兩半

澤瀉 苦蒲子

各半兩

木猪苓

漢防已

各一兩

右咬咀一錢水酒共半盞葱白三寸煎三分去滓小
便通利即瘥

內消丸 治小兒頭面手足虛浮

木香

一錢

防己

一錢

丁香

二十

青皮

五錢

去瓢判用巴豆十四

粒去殼同炒候黃
色去巴豆不用

右為末九麻子大每服三二歲五九四五歲七九或
十歲小兒陳皮湯下女兒艾葉湯下一日三服又方
實脾散消積飲能補脾消積進食五苓散通利水道
藥合和用蘿蔔子木通薏苡仁車前子草赤小
豆冬瓜仁糯米湯調入燒鹽蓋脾土固實去水腫消
一方五味同炒黃色去巴豆麪糊為丸小豆大三歲

三十九橘皮湯下

紅粉散 治小兒渾身虛腫氣喘不思飲食

硃砂

一錢 栴榔

一錢 輕粉

半錢

右為末每服一字及半錢薄荷湯調下喫一服則取
下仍用前觀音散人參散神朮散調其胃氣忌生冷
粗硬等物

檳榔丸 治小兒遍身浮腫

黑牽牛

三兩炒

青木香

青皮

防風

檳榔

各一兩

右為末麪糊為丸如芥子大每服二十九桑白皮湯

下

香橘丸 治小兒四肢腫滿

杏仁

十四枚

巴豆

十四枚

青皮

陳皮

各半兩

麪升半

右一處炒為細末醋糊為丸如菉豆大每服十九至

二十九冷姜湯下

宣氣散 治小兒腹急氣粗并治風腫氣腫通身腫及

瘡痘盛出身熱煩渴腹脹喘促大小便澀面青悶亂

又治久瀉不退脾虛生氣止與一服後補之

木香

一分 檳榔

橘皮

甘草

各半兩

黑牽牛

四兩半生半微

炒用

右咬咀一錢水半盞煎三分去滓服三歲一錢

香櫛散

治小兒疳食氣腹大氣粗一應浮腫並療

木香

檳榔

黑牽牛

青皮

各半兩

商陸

一兩

右為末三歲一錢煎水通湯調下或為糊丸小豆大

三十九米湯下肚大常服自消

分氣飲 治腫脹作喘氣短而急

北梗 赤茯苓 陳皮 桑白皮炒 大腹皮 枳

殼製 半夏麴 真蘇子微炒 紫蘇 甘草各二錢炙 草蓂

仁一錢

右剉散每服一錢半水一盞薑三片棗子一箇煎服
若心臍起掌心平缺盆平背心平不治大喘氣粗不
食乃腎水盈溢上行傍浸於肺亦不治

葶藶煎 治小兒腫滿服藥不退

葶藶

紙上炒
三分

防已

一兩半

澤瀉

三兩

澤漆葉

一兩半

赤茯苓

苓

去黑皮
三分

郁李仁

去皮尖炒
一兩一分

柴胡

去苗
二兩

杏仁

湯浸
去皮

尖雙仁炒研
如膏三兩

右七味粗搗篩水一斗煎三升半去滓入杏仁膏又

白蜜一斤慢火煎如稀錫每半錢溫水調下漸加之

更量大小加減

甘遂丸 治小兒腫滿結實諸治不瘥

甘遂

炒

葶藶

紙上炒

車前子

猪苓

去黑皮

杏仁

湯浸
去皮

夫雙仁

芍藥

各三分

澤漆葉

黃芩

去黑皮

鼈甲

去裙襖醋

炙各

半兩

右搗研為末煉蜜和丸如菉豆大五六歲兒每服五
九竹葉湯下以利為度量兒大小加減

塌氣散 退腫治積水驚水或飲水過多停積於脾故
四肢腫而身熱宜用內消之其腫自退

赤小豆

陳皮

蘿蔔子

甘草

各半兩

木香

一分

右為末薑棗煎量大小加減通口服

牽牛丸 治小兒疳氣頭面及四肢腫

黑牽牛 白牽牛 青皮 陳皮

右等分為末糊丸如小豆大三歲三十九米湯下小
腫常服自消

塌氣丸 治小兒疳腹脹喘急并面浮腫

丁香 胡椒 炒一分 蘿蔔子 炒 白牽牛 生各一兩

右為末麪糊為丸小豆大三歲三十九米湯下

治小兒身腫并手足腫兼癰癤

用巴豆五十枚去皮心水二升煎取一升用帛於湯中隨手拭之

治小兒毒氣攻腮腫赤可畏者

皂角

二兩
去核

天南星

二錢
生用

糯米

一合
為末

右為細末姜汁調塗立效

郁李丸 治小兒疳食氣急腫滿

郁李仁

湯泡去
皮炒

檳榔

各半
兩

牽牛

一分
炒

右等分為末糊丸小豆大三歲三十九葱白湯下不

拘時量兒大小加減

塌氣散 治小兒腹脹氣粗并疳食攻面目浮腫

木香

一分青皮

兩半

巴豆

三十粒同炒黃色去巴豆

右為末三歲半錢米湯調下食前連進即效量兒大

小以意加減

治小兒浮腫

蒲種殼

天羅

燈草

各等分

右用葱濃煎湯服之又煎洗之尤妙即愈

郁李仁湯 治小兒通體腫滿腹脹氣喘

郁李仁

湯浸去皮尖炒搗研用

大黃

煨判

柴胡

去苗各一兩半

芍藥

猪苓

去黑心

澤瀉

各一兩

赤茯苓

去黑皮

麻黃

去根節一分

升

麻

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

鼈甲

去裙襴醋炙各三錢

黃芩

去黑心各一兩

右粗搗篩每用二錢水一盞煎至五分去渣分溫二

服日再以利為度量兒大小加減

商陸散 治小兒浮腫腹滿氣急利小便

澤瀉 商陸

各等分

右為末三歲一錢煎桑白皮湯調下商陸醋炒為末
調塗腫毒妙醋調并治咽喉腫

治小兒臍腫

右取桂心炙令熟熨之日可四五度

治小兒熱腫

右用鯉魚胆塗之

甘遂丸 治小兒腫滿結實諸治無益者

一名澤漆丸
方見本門水

腫類

二牛丸 治小兒腫病大小便不利

黑牽牛 白牽牛

各四兩炒

右為末井花水為丸如菉豆大每服二十丸蘿蔔子

煎湯下

沉附湯 治腫面滿因積而得既取積而腫再作小便不利若再用利小便藥性寒而小便愈不通到此則束手矣蓋中下焦不升降為風寒痞隔故水凝而不通宜服沉附湯則小便自通喘滿自愈大小便通

久服無碍

附子

一隻生去皮
臍切成片子

右用生姜十片水三盞煎八分次用沉香一錢磨水
入藥再煎三沸空心服

胃苓丸 治腫滿因積而得既取積而種作小便不利
平胃散 五苓散

右等分和合蒸蒜九木通湯下

又方 治腫滿因積而得既取積而腫再作小便不利

平胃散

錢二

右煮蘿蔔子一碗取青汁一盞入藥用姜棗再入蘿蔔子同煎服

附豆丸 治脾虛受濕虛腫

附子

一隻生去皮切作四片

赤小豆

一盞

右用水浸慢火煮候豆熟附子透軟取附子焙乾為末以薏苡仁煮糊丸空心蘿蔔子煎湯吞下仍以燒鹽和所煮赤小豆空心食之

緊皮散 治一切腫經取已消脾胃虛弱

白朮

炮

赤茯苓

木香

澤蘭

厚朴

姜製

續斷

肉桂

檳榔

陳皮

去白

麥芽

炒

神麴

青皮

椒

目

木通

扁豆

各等分

右咬咀每服加薑棗子蘇葉同煎空心溫服之

海蛤散

治小兒腫病大小便不利

一名猪苓湯方見本門水腫類

水腫

附論

夫小兒水氣腫滿者由將養不調腎脾二臟俱虛故也

腎主水其氣不通於陰脾主土候於肌肉而剋水腎虛不能傳其水液脾虛不能剋制於水故水氣流溢於皮膚故令腫也其水腫者則皮薄如熟李之狀若皮膚虛受風風搏於氣致腫者但虛腫如吹此風氣腫也

方

檳榔散 治小兒水氣腫滿喘促坐卧不安

檳榔

煨熟炒

大黃

剉炒各三分

葶藶

紙上炒

牽牛子

炒各半兩

右搗羅為散三四歲每服半錢熟水調下以利為效

量兒大小加減

葶藶散

治小兒水腫氣粗

葶藶

炒

防己

甘遂

大戟

右等分為末三歲一錢桑白皮湯調下食前服

澤漆丸

治小兒水腫腹大諸藥不瘥

澤漆葉

葶藶

紙上炒各半兩

黃芩

去黑心

甘遂

炒

郁李仁

湯浸去皮尖炒研

芍藥

猪苓

去黑皮

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒研

車

前子

各三分

鼈甲

去裙醋炙

茈胡

去苗各半兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵為丸如菉豆大五六歲兒每服五丸溫水下更看兒大小增減一方用竹葉湯煎下

大戟丸 治小兒水氣浮腫

大戟 葶藶 炒各一錢 青皮 三錢 江子 半錢

右為末飯為丸每五丸茶湯下瀉後用人參白朮散補之

葶藶散 治小兒水腫

葶藶

隔紙妙一錢

牽牛

炒

桑白皮

炒

檳榔

等分

右為末生姜蜜湯調下

聖九子

治小兒水腫腹腫霍亂嘔逆腹冷食不下兩

脇痛并下痢膿血小便赤澀又理肺氣喘急咳嗽

用葶藶丸下痢松樹皮湯小便赤澀燈心湯喘急咳嗽

人參杏仁湯下如痢後腫先服益黃散次與之

二物湯

有患氣積急積久不瘥遂成水病攻面目身

從腰上腫此湯發汗悉愈

麻黃

去節
四兩

甘草

一兩

右咬咀三歲一錢水半盞煎三分去滓服

構皮湯 治小兒腫滿

構木白皮

切五合即
椿樹也

赤小豆

四合

赤茯苓

去黑皮
一兩半

右咬咀每服一錢水七分煎至四分去渣溫服日再

更量兒大小增減

桑根白皮散 治小兒水氣腫滿上氣喘促小便赤澀

大便稍難

一名猪苓湯
一名海蛤湯

桑白皮

半兩 剉

海蛤

一分

漢防已

一分

赤茯苓

白朮

甜葶藶

隔紙炒 令紫色

猪苓

去黑皮 各一分

川朴硝

一兩

右搗粗羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓
溫服更量兒大小加減服之

桑白皮散

治小兒水氣偏身腫滿喘促小便不利

桑根白皮

半兩 炒

射干

赤茯苓

黃芩

木通

剉

澤漆

澤瀉

漢防已

各半兩

右搗細末為散每服以煮赤小豆湯調下半錢每日

三四服者兒大小加減服之

牡蠣散 治大病瘥後腰以下有水氣者宜服之

牡蠣

煨

澤瀉

蜀漆

洗炒

商陸

葶藶

海藻

蘇

藪根

各等分

右為末三歲一錢燈心湯下小便利止

赤茯苓散 治水氣腫滿咳嗽喘不止

赤茯苓

桑根白皮

剉

貝母

煨令黃各半兩

川升麻

甜

葶藶

隔紙炒令紫色

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

桔梗

去蘆各一分

右搗粗羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣
溫服日三四服看兒大小加減服之

白朮散 治小兒水氣腫

白朮 木香 甘草 芍香 青皮 巴

炮

炙

炒

浸去皮切
各半兩

豆

三十粒去皮膜同青皮一處
炒好了仍去巴豆不要用

右為末飯飲調下

茯苓丸 治小兒水氣面目腫小便澀腹脹滿

赤茯苓

杏仁

湯浸去皮尖雙
仁麩炒微黃

陳橘皮

浸去白
瓢焙

漢

防已 紫蘇子

炒

甜葶藶

隔紙炒令
紫色半兩

右搗羅為散煉蜜和九如菜豆大每服煎桑根白皮
湯下十九日三服五歲以下減九服之

甜葶藶九 治小兒水氣通身腫滿心腹妨悶坐卧不

安

甜葶藶

隔紙炒
令紫色

牽牛子

微炒

雄雀糞

各半

大戟

一分

豆

十粒去皮心
紙裏壓去油

膩粉

一錢
研入

右搗羅為末都研令勻用棗穰和九如菜豆大每服

以溫水下一九日二服五歲已上加九服之

甘遂散 治小兒水氣遍身腫滿大小便難喘促不得

睡卧

甘遂

炒

大黃

剉炒

牽牛子

各三分

葶藶

紙上炒一分

檳榔

剉炒

右為散每服一字熟水調下以利為度量大小加減
水寶散 治小兒疳水氣息通身虛腫狀如熟李者服
之以利為度

童子青橘皮

珠子甘遂

微炒

右等分為末三歲一錢用麥蘖煎湯點臘茶清調下
食前通利為效忌醃酸食三五日凡治腫下氣虛只
與五苓散補

甘遂檳榔散 治積水疳水並宜服之

甘遂

青皮

去白

檳榔

取生用

陳皮

去白

各一錢

右末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草藥積水疳水皆宜
服之此候久而不痊必連陰腫脾腎俱壞之然如此
已是危證不可取下只用利水道固脾土當用之五

苓散和平胃散加麥門冬姜棗煎服一方無陳皮燈
心蘿蔔子湯下脚腫木瓜湯下

又方 治小兒積水

右用益黃散去丁香加木香去訶子加蘿蔔子為細
末大小以意加減煎湯調下

海蛤散 治小兒疳水腫滿氣急

澤瀉 海蛤 防已 各一分 苦蒲子 三十粒

右為末三歲一錢酒調下連進二服小便利即效

葶藶散 治小兒水氣腫滿

甜葶藶

隔紙炒

紫牽牛

畧炒取仁

白桑皮

炒

鷄心楠榔

大黃

各等分

右為末每服半錢水半盞生薑三片蜜半匙煎湯調下或煎大流氣飲研青木香丸灌下

山豆根湯 治小兒氣腫滿小便澀

山豆根 車前子 桑根白皮

各半兩

葵子

赤小

豆

各半兩

右細剉和勻每服取一分水一小盞煎至五分去渣
分為二服每日三四服隨兒大小以意加減

猪苓散 治小兒水氣腫滿小便不利臍腹妨悶喘促

猪苓

去黑心

桑根皮

剉

赤茯苓

海蛤

甜葶藶

隔紙

炒紫色
各一分

右搗粗羅為散每一錢水一小盞煎至五分去渣溫
服日三四服量兒大小加減

木香散 治小兒水氣四肢浮腫腹脇妨悶

木香

赤茯苓

各一分

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襖

川大黃

剉碎微炒

各一兩牽牛子

微炒三分

右搗細末為散每服以溫水調下半錢以利為度隨

兒大小加減

檳榔餅子 治小兒水氣四肢浮腫脹脇妨悶

檳榔

一分郁李仁半兩湯浸去皮微炒用

右搗羅為末以大麥麪一兩和作餅子煑灰內煨熟量兒大小與喫即得通利氣下也

冬瓜圓 治種種水氣

大冬瓜一枚先於頭邊切一盖子取去中間瓢以
赤小豆水淘淨填滿冬瓜中間再用盖子合了用
竹簽定以麻線繫紙筋黃泥通身固濟寧乾用糯
米穀舂取糠片兩大羅埋冬瓜在內以火着糠內
煨之候火盡取出刮去泥將冬瓜薄切作片子并
豆一處焙乾

右為細末以煮麪糊為丸如桐子大每服五十九煎

冬瓜子湯送下不拘時候小便利為驗

普濟方卷三百八十六